

LISTE DES GRAINESUNDO OFFERTES PAR LE ON D. C.

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation.)

Floraire - Chêne-Bourg, Genève.

20me CATALOGUE DE GRAINES

Terrestria sidera flores



Floraire - Chalet.

| Graines | de plantes alpines | p. 1 | lande et en Alskalie p. | 39 |
|---------|----------------------------|------|-----------------------------------|----|
| | de plantes vivaces d'orne- | | THE THE TENT | 40 |
| | ment | 21 | » en Siberie et Mongolie. | 42 |
| ,) | d'arbres et d'arbustes | 30 | » an Caucase et en ditent | 42 |
| >> | de plantes vivaces ou mon- | | » | 48 |
| | tagnardes récoltées dans | | " de enceces i destignos : | 44 |
| | l'Amérique du Nord | 36 | » reçues de l'Himalaya occidental | 44 |

DU SEMIS



Il est reconnu que les plantes alpines qu'on acclimate par le moyen du semis sont plus florifères et beaucoup plus résistantes à nos climats. Tandis que le 6 % à peine des plantes qu'on arrache dans la nature parvient à fleurir et à se développer dans les jardins, celles élevées de graines réussissent admirablement. Le jardin alpin d'acclimatation, qui a été fondé dans le but d'aider les amateurs et de les pourvoir de graines ou de plantes élevées par semis, donne ici la liste des semences récoltées par lui en 1894.

Pour les bien réussir il importe d'observer les conditions suivantes : faire un terreau léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers terre de bruyère (peat) ou terreau de feuilles, un tiers terre franche et un

tiers de sable.

Le moment le plus favorable à cette opération est l'arrière automne, c'est-à-dire fin Novembre ou commencement de Décembre ou le printemps. Pourtant il est certaines espèces (Anémones du groupe Pulsatille, Edelweiss, Composées et en général les graines munies d'aigrettes et de plumes) qui lèvent mieux si on les sème de suite après leur maturité. Mais dans la grande majorité des cas c'est l'arrière automne ou le premier printemps

qu'il faut choisir comme étant la meilleure époque pour les semis.

On sème dans des pots, terrines ou caissettes qu'on draine en remplissant le fond et jusqu'au tiers de leur hauteur, de briques ou de pierres ou bien encore de coke. Il faut avoir soin de très peu recouvrir les graines, surtout celles qui sont très fines. Certaines espèces même, telles que les Saxifragées, les Crassulacées, demandent à n'être pas du tout recouvertes. Ces pots seront placés sous une couche froide, le plus près possible du verre et dès qu'il tombera de la neige, on aura soin de les recouvrir et d'en former un monceau le plus haut possible. On enlève alors les châssis qu'on remet en place lors de la fonte de la neige, ceci pour les semis d'automne.

Dans les pays où la neige fait défaut il est préférable de ne semer qu'en Mars-Avril. Si l'on attend en Mai-Juin pour le faire il serait bon d'ajouter à la composition du sol indiquée plus haut un peu de Sphagnum tamisé dont l'effet modérateur est très avantageux à la germination des graines. Les bonnes pluies chaudes du printemps sont extrêmement favorables à la germination et il faut, le plus possible, exposer les semis à cette action bien-

faisante dont ils ne souffriront pas si les pots sont bien drainés.

On peut aussi semer en pleine terre, mais alors il faut avoir soin de surveiller les semis et d'empêcher les mauvaises herbes ou les insectes nuisibles de les détruire.

En général le semis est le même que celui des plantes annuelles ou vi-

vaces les plus délicates; il n'offre aucune difficulté et réussit bien.

Les genres qui germent le plus rapidement sont les Cistinées, les Violariées, les Crucifères, les Papilionacées; puis viennent les Composées, les Ombellifères, les Saxifragées, les Crassulacées, etc., etc. Ce sont les Gentianées et les Primulacées qui mettent le plus de temps à germer avec certaines Renonculacées, les Berbéridées, etc.

La germination des graines est, au reste, une chose capricieuse. Il ne faut jamais détruire un semis qui n'a pas levé avant une année pour le

moins.

Quand les graines ont germé, et que les plantules commencent à prendre un peu de consistance, c'est-à-dire qu'elles émettent la 2° et la 3° feuille audessus des cotylédons, il faut les repiquer, dans un terreau qui convienne à la nature de chacune d'elles. Lire à ce sujet notre volume, Les plantes alpines et de rocaille.

Espèces montagnardes et de rochers.

Seeds of alpine and mountain plants.

Nous ne donnons pas ici la description des plantes parce que la plupart de nos clients possèdent le petit volume « Plantes alpines et de rocailles et leur culture » par H. Correvon et que, d'autre part, notre catalogue de plantes (1899) contient plusieurs de ces descriptions.

Toutes nos semences se vendent au prix de 50 centimes le paquet.

Les personnes que le choix d'une collection embarrassent, peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines d'espèces montagnardes et vivaces aux prix suivants à notre choix.

| 12 | espèces | pour . | | | 5 frai | ncs |
|-----|----------|--------|------|---|--------|-----|
| 25 |)) | » · | | • | 10 |) |
| 50 |) | . " | * 10 | | 20 | 0 |
| 100 |)) |)) | | | 40 |) |

Our seeds are sold to the price of 50 cts. (5 d.) each paquet.

We make collections to our own choice:

| 12 kinds for | 5 francs (4 sh.) | |
|--------------|---------------------------------------|--|
| 25 » » | | |
| 50 » » | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 100 » » | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

Espèces montagnardes et de rochers.

Acæna myriophilla.

- » ovalifolia.
- » ovina.
- » pinnatifida.
- » repens.
- » sanguisorbæ.
- » sarmentosa.
- » trifida.

Charmantes pl. gazonnantes très propres à garnir les rocailles.

Acantholimon glumaceum.

- » libanoticum.
- » venustum.

Achillea argentea.

- » atrata.
- » Clavenæ.
- » crustata.
- » Gerberi.
- » herba Rota.
- » impatiens.
- » lanata.
- » ligustica×lingulata.
- » macrophylla.
- » moschata.
- » nana.
- » Portæ.
- » ptarmica.
- » pyrenaica.
- » rupestris.
- » sericea.
- » setacea.
- » speciosa.
- » sudetica.
- » tavgetea.
- » tomentosa.

Aconitum album.

- » anthora.
- » cernuum.
- » Fischeri.
- » Kuznezowi.
- » lycoctonum.
- » napellus.
- » à fl. blanches.
- » orientale.
- » pallasii.
- » paniculatum.
- » pyrenaicum.
- » septentrionale.
- » tauricum.
- » uncinatum.
- » variegatum.
- » volubile.

Actæa brachypetala.

- » japonica.
- » racemosa.
- » spicata.

Actæa spictata à fruits rouges.

Adenostyles albifrons.

Adenostyles alpina.

» leucophylla.

Adonis vernalis.

- » pyrenaica.
- » wolgensis.

Aethionema armenum.

- » coridifolium.
- » grandiflora.
- » iberideum.
- » persicum.
- » saxatile.
- » Thomasianum.

Jolies pl. naines à fl. roses; abondante floraison.

Agrimonia eupatorium.

» repens.

Agrostis alpina.

- » diegoensis.
- » exarata.
- » rupestris.

Ajuga pyramidalis.

Alchemilla alpina.

- acutiloba.colorata.
- " conjuncte
- » conjuncta.
 » coriacea,
- » glaberrima.
- » Hoppeana.
- » Lapeyrousei.
- » major.
- » minor.
- » montana.
- » pallens.
- » pastoralis.
- » pubescens.
- » pyrenaica.
- » schmidelyana.
- » speciosa.
- » splendens.
- » strigosula.
- » subcericea.
- » vulgaris.

Allium Karataviense.

- » moly.
- » neapolitanum.
- » nigrum.
- » odoratum.
- » sibiricum.
- » Victoriale.

Alsine banatica.

- » bauhinorum.
- » biflora.
- » gerardi.
- » jacquini.
- » juniperifolia.
- » laricifolia.
- » liniflora.
- » peploides.
- » pinifolia.

Alsine recurva.

- » rosani.
- » verna.
- » villarsii.

Alyssum argenteum.

- » alpestre.
- » creticum.
- » gemonense.
- » incanum.
- » maritimum.
- » minimum.
- » Mællendorfianum.
- » montanum.

Alyssum orientale.

- » petræum.
- » repens.
- » Rocheli.
- » rostratum.
- » saxatile.
- » serpyllifolium.
- » speciosum.
- » spinosum.
- » Transylvanicum.
- » umbellatum.
- » Wiersbickii.
- » Wulfenianum.

Anandria Bellidiastrum.

Anarrhinum bellidifolium.

Andromeda polifolia.

Androsace carnea.

- » chamæjasme.
- » Charpentieri.
- » ciliata.
- » coronopifolia.
- » cylindrica.
- » elongata.
- » filiformis.
- » foliosa.
- » Helvetica.
- » glacialis.
- » Hausmanni.
- » Hedræantha.
- » lactea.
- » lactiflora.
- » obtusifolia.
- » Laggeri.
- » Pacheri.
- » sarmentosa.
- » septentrionalis.
- » villosa.
- » vitaliana.

Andryala lanata. (Hieracium lanatum).

Anemone alpina.

C'est la grande et belle anémone à fl. blanches des régions alpines. On l'élève facilement de graines mais celles-ci germent lentement.

- » apennina.
- » Baldensis.
- » borealis.
- » decapetalá.
- » dichotoma.
- » globosa.
- · Halleri.

Anemone magellanica.

- » montana.
- » multifida.
- » narcissiflora.

L'une des plus faciles à cultiver mais à germination lente ; fl. roses en jolis bouquets dressés.

Anemone nemorosa, la jolie sylvie des bois.

- » patens.
- » à fleurs blanches.
- » pratensis.
- » var. nigricans.
- » var. obsoleta.
- pulsatilla.
- » rivularis.
- » rubra.
- » sulfurea.

La belle anémone soufrée des Alpes.

» sylvestris.

Grande fl. blanche à revers rose ; pl. envahissante et de culture facile.

Anemone virginica.

Angelica officinalis.

L'Angélique des confiseurs.

Angelica sylvestris.

» tomentosa.

Antennaria alpina.

- » carpathica.
- » dioica.
- » monocephala.
- » plantaginea.

Anthemis austriaca.

- » Biebersteini.
- » Blancheana.
- » Bourgæi.
- » carpathica.
- » cinerea.
- » macedonica.
- » montana.
- » nobilis. (Camomille romaine.)
- » serbica.
- » rigescens.
- » tinctoria.
- » sp. Bulgarie.
- » sp. Caucase.

Anthericum ramosum. Petit lys blanc. des rochers.

Anthyllis montana.

- » vulneraria.
 - » rubra.

Anticlea glauca.

Antirrhinum asarina.

» glutinosum.

Excellente plante murale.

Antirrhinum sempervirens. Aphyllanthes monspeliensis. Aquilegia alpina.

- » arctica.
- » atrata.
- » Baïkalensis.
- » Bertoloni.
- » burgeriana.
- » californica.
- » canadensis.
- » chrysantha.

Aquilegia cœrulea.

L'une des plus belles fl. des Montagnes Rocheuses.

Aquilegia flabellata. Blanc pur.

» glandulosa.

Fleur très grande d'un très beau bleu, à corolle azurée.

Aquilegia longicalcarata.

- » nigricans.
- » Olympica.
- » oxypetala.
- » pyrenaica.
- » skinneri. Fl. rouge et jaune.
- » Stuartii.
- » truncata fl. rouge et jaune.

» vulgaris.

(voir graines Plantes vivaces.)

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur.

Arabis albida.

- » Allionii.
- » alpestris.
- » alpina.
- » arenosa.
- » aubrietioides.
- » bellidifolia.
- » cœrulea.
- » crispata.
- » fastigiata.
- » Gerardi.
- » lucida.
- » perfoliata.
- » pumila.
- » soyeri.
- » sudetica.
- » turrita.

Arctostaphylos (v. graînes d'arbustes). Arenaria banatica.

- » biflora.
- » cœspitosa.
- » ciliata.
- » gracilis.
- » graminifolia.
- » hispida.
- » leptoclados.
- » montana.
- » pinifolia.
- » purpurascens.
- » tetraptera.
- » verna.
- » sp. Hazara.

Arisaema triphylla.

Armeria alpina.

- cephalotes.halleri.
- » juncea.
- » laucheana.
- » longiaristata.
- » plantaginea.
- » setacea.
- » speciosa.
- » wellwitchii.

Arnica chamissonis.

- » foliosa.
- » montana.

Arnica sacchalinense.

(voir graines d'Amérique).

Aronicum carpathicum.

» scorpioides.

Le beau soleil d'or des Alpes.

Artemisia absinthium (Absinthe).

- » annua.
- » canadense.
- » desertorum.
- » dracunculus.
- » filifolia.
- » frigida.
- gnaphalioides.
- glacialis.

Le Genépi des Piémontais.

- » gracilis.
- » granatensis.
- » japonica.
- » maritima.
- » mexicana.
- » moxa.
- » mutellina.
- » nitida.
- » parviflora.
- » pauciflora.
- » pedemontana.
- » pontica.
- » procera.
- » rupestris.
- » selengensis.
- » sieversiana.
- » spicata le vrai genépi.
- » stelleriana.
- » tridentata.
- » valesiaca.
- » vulgaris.

Jolies Composées alpines aromatiques au feuill. finement divisé et généralement blanc d'argent.

Asarum canadense.

- » europæum.
- » grandiflorum.

Asperura odorata (Maitrank.)

» taurina.

Aster alpinus.

- » Baldensis.
- » speciosus.
 - » à fl. blanches.
- » » roses.
- » longipetiolatus.
- » amellus.
- » bessarabicus.
- » diplostephioides.
- » himalaicus.
- » pyreneus.
- » sibiricus.
- » wahli.

Astragalus alopecuroides.

- » aristatus.
- » caryocarpus.
- » cicer.
 - » crotalariæ.
- » depressus.
- » drummondi.
- » exscapus.

Astragalus hypoglittis.

- » maximus.
- » monspessulanus.
- » Murryi.
- » Onobrychis.
- » pictus.
- » purpureus.
- » ramosus.
- » reflexistipulus.
- » Shortianus.
- » sinicus.

Astrantia carniolica.

- » gracilis.
- » Helleborifolia.
- » major (Etoile des Alpes).

Plante très montagnarde et des plus faciles à cultiver.

- » minor.
- » neglecta.
- » pauciflora.

Athamante cretensis.

» Matthioli.

Atragene alpina.

Clématite bleue des Alpes.

» sibirica.

Atropa Belladona (Belladone).

» à fruits jaunes.

Aubrietia antilibani.

- » columnae.
- » deltoidea.
- » erubescens.
- Eyrii.
- » græca.
- » Hendersonni.

Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fl. d'un lilas plus ou moins vif suivant les esp.

Azalea procumbens.

Ballota spinosa.

Bartsia alpina.

Bellidiastrum Michelli.

Bellis annua.

- » cærulescens.
- » perennis (Pâquerette).

Bellium bellioides.

- » crassifolium.
- » minutum.

Berteroa incana.

Betonica alopecuros.

- » grandiflora.
- » hirsuta.
- » incana.
- » officinalis.
- » stricta.

Biscutella lævigata.

Bletilla Hyacinthina.

Borago caucasica.

» laxiflora.

Botrychium Lunaria.

Boykinia aconitifolia.

- » elata.
- » rotundifolia.

Brassica Richeri.

Braya alpina.

» pinnatifida.

Briza media.

Bromus Schraderi.

» squarrosus.

Bryonia dioica (pl. grimpante à fruits rouges).

Bulbocodium vernum.

Buphtalmum grandiflorum.

- » salicifolium.
- » speciosum.
- » speciosissimum (récoltée dans les Alpes bergamasques).

Bupleurum longifolium.

- » fruticosum.
- » ranunculoides.

Butomus umbellatus (Aquatique).

Calamintha grandiflora.

» officinalis.

Calandrinia umbellata.

Calla palustris (aquatique).

Callitriche stagnalis.

Caltha palustris.

- » leptosepala.
- » radicans.

Campanula abietina.

» alliariæfolia.

Campanula Allionii.

- » alpina.
- »- azurea.
- » barbata.
 - » » à fl. blanches.
- » Baumgarteni.
- » betonicæfolia.
- » bononiensis.
- » cæspitosa.
 - » à fl. blanches.
- » carnica.
- » carpathica.
- » » à fl. blanches.
- » caucasica.
- » celtidifolia.
- » cenisia.
- » collina.
- » dasycarpa.
- » elasines.
- » elatinoides.
- » eryocarpa.
- » excisa.
- » fragilis.
- » garganica.
- » glomerata.
- » à fl. blanches.
- » hederacæa.
- » lactiflora.
- » latifolia.
- » à fl. blanches.
- » linifolia
- » macrorhiza.
- » mirabilis.
- » nobilis.
- » patula.
- » pelviformis. (Hort., non Lam.).
- » persicifolia.
- · pilosa.
- » pusilla.
- » punctata.

rhomboidalis.

Campanula rotundifolia.

- » Sarmatica.
- » Saxifraga.
- » Scheuchzeri.
- » sibirica.
- » speciosa.
- » spicata.
- » Steveni.
- » subpyrenaica.
- » Tenorii.

Campanula thyrsoidæa.

- » tridentata.
- » turbinata.
 - » à fl. blanches.
- » tyroliensis.
- » urticifolia.
- » Valdensis.
- » Vanneri.

Les Camp. sont faciles à élever par semis. Les espèces les plus faciles, les plus florifères et les plus jolies sont : Alliariæfolia, carpathica, eryocarpa, lactiflora, persicifolia, pusilla, sarmatica et turbinata. Les alliariæf. et nobilis sont à fl. blanches, thyrsoidæa à fl. jaunes et les autres à fl. lilas plus ou moins foncé, sauf leurs var. à fl. blanches. Toutes fleurissent dans l'été, à partir de la fin de mai et sont excellentes pour les rocailles ou la platebande.

Cardamine alpina.

- » chenopodifolia.
- » macrophylla.
- resedifolia.
- » trifolia.

Carduus defloratus.

Carex appressa.

- » cyperoides.
- » Hordeiformis.
- » japonica.
- » maxima.
- » nigra.
- » petræi.
- » secalina.
- » trifida.
- xanthophysa.

Carlina acaulis.

Ce sont les superbes chardons d'argent qui, l'automne, animent les pentes de nos monts. où ils forment des touff. naines d'une grande beauté.

Cathcarthia villosa.

Centaurea alpina (à fl. jaune paille).

- » axillaris.
- » dealbata.
- » depressa.
- » Lugdunensis.
- » montana.
- » à fl. blanches.
- » nervosa.
- » orientalis (à fl. jaunes).
- » petrophylla.
- » præalta.
- » Ruthenica (à fl. jaune citron).
- » rutifolia.
- » spinulosa.
- » sulfurea.
- » transalpina.
- » uniflora.

Centranthus angustifolius.

» ruber. (Valériane rouge des murs.)

Cephalaria alpina Schrad.

- » procera.
- » radiata.
- » tatarica.
- » transylvanica.

Grandes scabieuses jaunes aux formes architecturales.

Cerastium alpinum.

- » Biebersteini.
- » chloræfolium.
- » frigidum.
- glaciale.
- » glandulosum.
- » illyricum.
- » lanatum.
- » longirostre.
- » pennsylvanicum.
- » tomentosum.
- » villosum.

Ce sont de petites pl. traînantes aux innombrables fl. blanches.

Cerinthe alpina.

» auriculata.

Chamæmelon caucasicum.

» oreades.

Cheiranthus alpinus.

Très jolie crucifère aux fl. jaune vif, odorantes.

Chenopodium Bonus Henricus.

Chicorium Intybus.

» à fl. blanches.

Chionodoxa Alleni.

- » cretensis.
- » Luciliæ.

Chrysanthemum alpinum.

- » caucasicum.
- » corymbosum.
- » lacustre.
- » maximum.

» montanum. Cimicifuga fœtida.

» racemosa.

Cineraria aurantiaca.

» campestris.

Cirsium Eryophorum.

- » Erysithales.
- » heretophyllum.
- » japonicum.
- » monspessulanus.
- » Rhizocephalum.
- » Semenowi.
- » spinosissimum.

Claytonia perfoliata.

- » sibirica.
- » virginica.

Clematis recta.

Cochlearia Danica.

» officinalis.

Colchicum autumnale.

- » Bertoloni.
- » variegatum.

Colluria geoides.

Comarum palustre. Convallaria majalis (Muguet).

Convolvulus mauritanicus.

Soldanella.

Coptis anemonæfolia.

Corchoropsis crenata.

Coris monspeliensis.

Coronilla Emerus.

- montana.
- parviflora.
- varia.

La jolie coronille lilas et violet.

Cortusa Mathioli.

grandiflora.

pubens.

Corydalis glauca.

lutea.

Très propre à garnir les murailles, où il fleurit constam-

- nobilis.
- ochroleuca.
- sempervirens.
- Scouleri.

Cotyledon (Umbilicus).

- chrysanthus.
- ciliolatus.
- globulariæfolius.
- horizontalis.
- oppositifolius.
- platyphyllus.
- spinosus.

Crassula rubens.

Crepis aurea.

- blattarioides.
- grandiflora.
- japonicus.
- jubata.
- montana. pygmæa.
- sibirica.

Crocus vernus.

- Mazziaricus.
- speciosus.

Crucianella stylosa.

Crythmum maritimum.

Cucubalus bacciferus.

» japonicus.

Cyclamen coum.

- europæum.
- græcum.
- hederæfolium.
 - à fl. blanches.

Cynoglossum officinale.

nervosum.

Daphne mezereum (Bois gentil).

- alpina.
- striata.

Delphinium Cachemirianum.

- à fl. blanches.
- cardiopetalum.
- caucasicum.
- Cheilantum.
- elatum.
- flexuosum.
- grandiflorum.

La fl. est du plus bel azur qu'il soit possible de rèver.

Delphinium orientale.

- Requienii.
 - speciosum.
- triste.
- Zalil (à fl. jaunes).

Dentaria bulbifera.

- digitata.
- pinnata.
- poliphylla.

Dianthus acaulis.

- alpinus.
- alpestris.
- ambiguus.
- arenarius.
- aridus.
- armeria.
- atrococcineus.
- atrorubens.
- attenuatus.
- Bannaticus.
- bicolor.
- brachyatus.
- cæsius.
- campestris.
- glaber.
- capitatus.
- carthusianorum.
- var. multibracteatus.
- caryophyllus.
- ciliatus.
- controversus.
- corsicus.
- corymbosus.
- croaticus.
- cruentus.
- deltoïdes.
- albus.
- fragrans.
- giganteiformis.
- giganteus.
- glacialis.
- glaucus.
- glutinosus.
- gracilis.
- graniticus.
- heptaneurus.
- hispanicus.
- Liburnicus. mœsiacus.
- monspessulanus.
- neglectus.
- Pancicii.
- pallens.
- parviflorus.
- petræus.
- pinifolius.
- Plumarius.

L'une des meilleures pl. à bordures et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les roc., les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

- Pontederæ.
- pubescens.
- purpureus.

Dianthus racemosus.

- Requieni.
- rupicola.
- sabuletorum.
- sanguineus.
- Scheuchzeri.
- Seguieri.
- speciosus.
- spiculifolius.
- squarrosus.
- suavis.
- subacaulis.
- superbus.
- var. nanus.))
- sylvestris.
- à fl. blanches.
- tener. tenuifolius.
- velutinus.
- versicolor.
- viscidus.
- wimmeri.

Les œillets, surtout dans le groupe des Plumarius, squarrosus, etc., sont excellents pour garnir les lieux arides et ensoleillés; ils se contentent de peu et donnent avec abondance de délicieuses fl. odorantes. Tous s'élèvent facilement de semis.

Dicentra eximia.

- Digitalis ferruginea.
 - grandiflora. lævigata.

 - lanata.
 - lutea. purpurea.
 - à fl. blanches.
 - sibirica.
 - Thapsi.

Ce sont des pl. solides et à flor. prolongée.

Dioscoræa caucasica.

Dipsacus asper.

- ferox.
- japonicus.

Dodecatheon giganteum.

- integrifolium.
- Jeffravi.
- Mædia.
- v. alpinum.
- v. pauciflorum.
- v. splendens.

Doronicum austriacum.

- caucasicum.
- Columnæ.
- Hungaricum.
- Pardalianches.

Dorycnium herbaceum.

suffruticosum.

Draba aizoides.

- altaica.
- arabisans.
- armata.
- borealis.
- brunifolia.
- carinthiaca.
- chamæjasme.

Draba Dedeana.

- Fladnizensis.
- frigida.
- glacialis.
- hebecarpa. hispanica.
- incana.
- Johannis.
- Kotschyi.
- lactea.
- Laponica.
- lasiocarpa.
- magelense.
- nemoralis.
- nivalis.
- pyrenaica (Petrocallis).
- Scandinavica.
- stellata.
- Thomasii.
- tomentosa.
- tridentata.
- Wahlenbergi.
- Zahlbruckneri.

Dracocephalum austriacum.

- altaiense.
- argunense.
- grandiflorum.
- integrifolium.
- japonicum.
- Moldavicum.
- nutans.
- peregrinum.
- Ruprechti.
- Ruyschianum.
- stramineum.
- thymifolium.

Dripis spinosa.

Dryas Drummondi.

- lanata.
- octopetala.

L'une des plus gracieuses pl. tapissantes pour rochers; grandes fl. blanches; graines lèvent bien.

Echium petræum.

Edelweiss (voir Gnaphalium).

Edrayanthus dalmaticus.

dinaricus.

Empetrum nigrum.

Ephedra (voir gr. arbustes).

Epilobium abyssinicum (fl. d'un carmin très vif).

- alpinum.
- à fl. blanches.
- angustifolium.
- à fl. blanches.
- boreale.
- japonicum.
- luteum.
- Fleischeri.

rosmarinifolium.

Epimedium colchicum.

Epipactis palustris.

Eranthis cilicica.

yemalis.

Erica carnea.

multiflora.

Erica tetralix. Erigeron alpinus.

- aurantiacus.
- caucasicus.
- compositus.
- Coulteri.
- erythrocephalus.
- flagellaris.
- glabellus.
- glaucus.
- macranthus.
- multiradiatus.
- pulchellus.
- speciosus.
- umbellatus.
- uniflorus.
- Villarsii.

Erinus alpinus.

- à fl. blanches.
- hirsutus.
- hispanicus.

Très jolies petites pl. à semer dans les vieux murs ou les rochers au soleil.

Eriogonum flavum.

» umbellatum.

Eriophorum angustifolium.

Scheuchzeri.

Eritrichium nanum.

Erodium cheilantifolium.

- daucoides.
- glandulosum.
- hymenodes.
- macrophyllum.
- Manescavi.

L'une des meilleures pl. de roc. fleurissant tout l'été et l'automne. Grandes et belles fl. carmin vif.

pelargoniifolium.

Erpetion reniforme. Eryngium alpinum.

Le vrai chardon bleu des Alpes; c'est l'une des plus belles pl. à cultiver dans les jardins et l'une de celles dont la culture est la plus facile. On vend la plupart du temps, sous ce nom, le vulgaire Eryngium d'Af-

- amethystinum.
- Bourgati. (Le Chardon bleu des Pyrénées.)
- cæruleum.
- campestre.
- creticum.
- giganteum.
- maritimum (à feuillage bleuâtre).
- petiolatum.
- Vaseyi.

Erysimum asperum.

- altaiense.
- canescens.
- Hieracifolium.
- ochroleucum.
- Petrowskianum.
- pulchellum.

Très jolie pl. rampante, à fl. jaune vif; floraison prolongée; cult. facile.

- purpureum.
- Rhæticum.
- Wittmanni.

Erythræa centaurœa.

- chloodes.
 - latifolia.

Erythonium Dens Canis (Dent de Chien).

sibiricum.

Euphorbia Gerardiana.

- Lathyris.
- Myrsinites.

Euphrasia hirtella.

- lutea.
- minima.
- montana.
- officinalis.

Falcaria latifolia.

Farsetia clypeata. » lunarioides.

Festuca amethystina.

» californica.

Festuca duriuscula.

- elegans.
- gigantea.
- glauca.
- Halleri.
- pulchella.
- spadicea.
- valesiaca.
- violacea.

Petits gazons des Alpes à feuillage fin.

Fragaria indica.

» elatior.

Frankenia lævis.

Fritillaria Meleagris.

- à fl. blanches.
- acmopetala.
- pyrenaica.
- ruthenica.

Galium rotundifolium.

Gaultheria Shallon.

Gaya simplex.

Gentiana acaulis.

L'une des meilleures pl. des Alpes; germination lente mais sûre.

- alba (d'Amérique).
- alpina.
- amarella (annuelle).
- Andrewsi (d'Amérique).
- angulosa (annuelle).
- angustifolia.
- asclepiadea.
- à fl. blanches.
- bavarica.
- Bigelowi (d'Amérique).
- brachyphilla.
- brevidens.
- Burseri.
- »· lutea.
- purpurea.
- campestris (annuelle).
- Clusii.
- cruciata.
- decumbens.
- Favrati (hybride des g. bavarica et verna).
-)) Fetisowii.
- frigida.

Gentiana germanica (annuelle).

- imbricata.
- involucrata (annuelle).
- Kesselringii.
- Kochiana.
- lutea.

Bonne pl. aux formes architecturales, à la hampe garnie de fl. jaunes, aux larges et belles f. nervées; fait un bel effet dans les rocailles ou isolée dans le gazon.

- macrophylla.
- nivalis (annuelle).
- pannonica.
- Parryi (d'Amérique).
- phlogifolia.
- Pneumonanthe.
- Przewaldsky.
- punctata.
- purpurea.
- pyrenaica.
- Rostani.
- Saponaria.
- septemfida.
- serrata.
- squarrosa.
- straminea.
- tenella.
- Tibetica.
- utriculata (annuelle).
- verna.
- v. atrocœrulea.
- v. azurea.
- v. grandiflora.
- Walujevii.

Geranium aconitifolium.

- affine.
- albiflorum.
- argenteum.
- armenum.
- Bohemicum.
- cinereum.
- Endressi.
- Fremonti.
- Gymnocaulon.
- Ibericum.
- macrorhizum.
- nepalense.
- v. japonicum.
- palustre.
- platypetalum.

nodosum.

pratense.

Excellente plante pour rochers et plates-bandes fleurissant tout l'été.

- roseum.
- à fl. blanches.

Le type est une plante basse à grandes fl. rose vif.

- sessiliflorum.
- sylvaticum.

Très belle esp. à fl. violettes et centre blanc.

Wilfordi.

Geum Chilcense (à fl. rouges).

- coccineum (à fl. vermillon).
- heterocarpum.

Geum hybridum.

- inclinatum.
- intermedium.
- Magellanicum.
- montanum.
- pyrenaicum.
- reptans.

L'une des plus belles fl. des Alpes.

- rivale.
- Rhæticum.
- strictum.
- triflorum.
- tvrolense.

Gillenia trifoliata.

stipulacea.

Très belles pl. viv. voisines des Spirées, à port élégant, à grandes fl. blanches.

Globularia cordifolia.

- nudicaulis.
- trychosantha.
- vulgaris.
 - à fl. blanches. >>

Glossocomia clematidea.

Gnaphalium Leontopodium.

L'Edelweiss se sème dans un sol léger et poreux, se repique à l'état de jeune pl. et se cultive en plein soleil dans un sol, si possible, calcaire. Voir Leontopodium.

- multiceps.
- supinum.
- sylvaticum.

Gymnadenia albida.

» conopea.

Gypsophila repens.

- Rokejeka.
- transylvanica.

Haberlea Rhodopensis.

Hacquetia Epipactis.

Haloxylon Ammodendron.

Haplocarpha Leichtlini.

- **Hedysarum** boreale. denticulatum.
 - multijugum.
 - obscurum.

Helianthemum alpestre.

- amabile.
- apenninum.
- aurantium.
- cruentum.
- Fumana.
- grandiflorum.
- mutabile.
- œlandicum.
- polyfolium.
- roseum.
- sanguineum.
- sulfureum.
- tomentosum.
- vulgare.

Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, jaunes, roses, rouge vif, pourpres ou blanches, se succédant pendant presq. toute l'année; cult. très facile. Pl. naines et touffues, excell. pour les rochers et talus arides.

Helleborus feetidus.

- niger (Rose de Noël).
- orientalis.
- purpureus.
- viridis.

Hepatica angulosa. Heracleum alpinum.

- giganteum.
- Mantegazzianum.

Les gr. de cet Heracleum nous ont été apportées du Caucase en 1892. C'est une pl. superbe, gigantesque, et dont la description dans le « Nuove Giornale botanico italiano, » vol. II, avril 1895, donne à peine une idée suffisante bien que l'auteur attribue au moins 10,000 fleurs à sa large ombelle que porte une hampe de 2 à 3 mètres de haut. C'est une bonne pl. viv., propre à isoler dans les pelouses, de cult. extrêmement facile et à forte odeur anisée; elle est tout à fait nouvelle.

- montanum.
- pyrenaicum.

Herniaria hirsuta.

- incana.
- pyrenaica.

Hesperis nivea.

Heuchera altissima.

- bracteata.
- rubifolia.
- sanguinea.

Délicieuse saxifragée des montagnes du Mexique, aux fl. roses vif et se succédant de mai en août.

Hieracium albidum.

- alpinum.
- v. Halleri.
- aurantiacum.
- boreale.
- Bornmülleri (d'Orient).
- Dovrense.
- italicum.
- lanatum.
- Pelleterianum.
- stoloniferum.
- villosum.

Homogyne alpina.

Horminum pyrenaicum.

Hugueninia tanacetifolia.

Hyacinthus amethystinus.

dubius.

Hydrocotyle vulgaris.

Sibthorpioides.

Hydrophyllum virginicum. Hypericum Androsæmum.

- Ascyron.
- atomarium.
- aureum.

Très bel Hyp. américain aux innombrables fl. jaune

- Beoticum.
- calycinum.
- Coris.
- densiflorum.
- Desetangii.
- elatum. 73
- elegans.
- empetrifolium.

Hypericum Gebleri.

- grandiflorum.
- hircinum.
- hirsutum.
- inodorum.
- japonicum.
- Orientale.
 - decussatum.
- patulum.

Très belle pl. qui se couvre de grandes fl. jaunes.

- perforatum. (Millepertuis.)
- poliphyllum.
- prolificum.
- pyramidatum.
- quadrangulum.
- Rhodopeum.
- Richeri.
- Scouleri.
- tetrapterum.
- tomentosum.
- Transylvanicum.

Hypochæris Helvetica.

maculata.

Hyssopus officinalis.

- Pl. très aromatique, à fl. bleu foncé.
- officinalis à fl. blanches.
 - à fl. rouges.
- sp. Asie Centrale.

Iberis Bernardiana.

gibraltarica.

Belle et bonne pl. à fl. se succédant pendant une bonne partie de l'année.

- jucunda.
- saxatilis.
- sempervirens.

L'une des meilleures pl. à rocailles et bordures; fl. blanc pur, de mai en juillet; effet éclatant.

- stylosa.
- Tenoreana.
- umbellata.

Impatiens Noli Tangere.

Balsamine jaune des Alpes.

glandigera.

Imperatoria Ostruthium.

Inula ensifolia.

glandulosa.

Sorte d'Arnica à très grandes fl. originaire du Caucase.

- Helenium.
- oculus Christi.

Ionopsidium acaule.

Iris (voir pl. vivaces).

Isatis japonica.

» tinctoria.

Jasione Jankæ.

» montana.

Juncus arcticus.

glaucus.

Juniperus (voir arbustes).

Kernera saxatilis.

Lactuca perennis.

» scariola.

Lappa major.

Laserpitium gallicum.

- gaudinii.
- halleri.

Laserpitium latifolium.

- peucedanoides.
- siler.

Lasiagrostis Calamagrostis.

Lathyrus angustifolius.

- aureus.
- cirrhosus.
- heterophyllus.
- montanus.
- palustris.
- sylvestris.

Lavande (voir pl. vivaces).

Leontopodium alpinum (Edelweiss).

Semer dans sol léger et tenir plutôt sec; repiquer jeune et cultiver au soleil et dans sol calcaire. Diviser tous

- japonicum.
- sibiricum.
- transylvanicum.

Lepidium alpinum (Hutschinsia).

- brevicaule.
- nebrodense.
- petræum.
- virginicum.

Leucojum æstivum.

» vernum.

Leuzea coniferæ.

Levistichum officinale.

Libanotis montana.

Ligusticum aromaticum.

» pyrenaicum.

Lilium bulbiferum.

- » chalcedonicum.
- dahuricum.
- dalmaticum.
- Martagon.
- à fl. blanches.
- Cattaniæ.
- pyrenaicum.
- Pl. remarquable; c'est un Martagon à fl. jaunes avec anthères vermillon.

Linaria alpina.

- anticaria.
- cilicica.
- cymbalaria.
- à fl. blanches.
- dalmatica.
- genistifolia.
- macedonica.
- origanifolia.
- pallida.
- Pancicii.
- petræa.
- pilosa.
- purpurea.
- striata.
- » tricalcarata.
- triphylla.
- tristis.

Linaria vulgaris×striata.

Lindelofia spectabilis.

Linnæa borealis.

Linum alpinum.

» austriacum.

Linum cartharcticum.

- flavum.
- Lewisi.
- maritimum.
- narbonense.
- provinciale.
- sibiricum.
- squamulosum.

Les Linum alpinum, austriacum et sibiricum sont de charmantes esp. à fl. bleu d'azur, fleurissant très longtemps. Culture facile.

Lithospermum officinale.

- petræum.
- purpureo-cœrulum.

Lloydia serotina.

Lonicera (voir arbustes alpins).

Lotus americanus.

- » corniculatus.
 - v. japonicus.

Lunaria rediviva.

Luzula campestris.

- lutea.
- multiflora.
- nivea.
- pallescens.
- parviflora.
- spicata.
- sudetica.
- sylvatica.

Ce sont d'excellentes graminées à planter sous bois, dans les lieux où les fl. ne réussissent pas; la nivea a des panaches argentés très gracieux.

Lychnis alpina.

- à fl. blanches.
- flos Jovis. Fl. de Jupiter.
- à fleurs blanches.
- flos cuculi.
- Lagascæ.
- Laponica.
- viscaria.

Jolie Caryophillée rose carmin vif, facile à élever de graines.

viscaria à fl. blanches.

Lynosiris vulgaris. Lysimachia vulgaris.

Lythrum Salicaria.

» virgatum.

Malva alcea.

- crispa.
- moschata.
- sylvestris.

Mandragora vernalis.

Matricaria ambigua. Mayanthemum bifolium.

Meconopsis cambrica.

(Pavot jaune.) Cette pl. est excellente pour les lieux frais et ombragés.

- cambrica à fi. orangé.
- à fl. doubles.
- Nepalensis.
- paniculata.
- petiolata.
- Wallichiana (voir plants de l'Himalaya).

Melandrium diurnum (à fl. roses).

Melica altissima.

Melica californica.

» ciliata.

Melissa officinalis. Mentha piperita.

- » Pulegium.
- tomentosa.
- viridis.

Menyanthes trifolia (trèfle d'eau).

Mertensia (voir pl. vivaces).

Meum athamanticum.

L'une des plus fines verdures qu'on puisse imaginer.

Mutellinum.

Micromeria filiformis.

- » græca.
- Juliana.
- » rupestris.

Petites Labiées odorantes, propres à garnir roc. au soleil.

Mimulus primuloides.

Mitella dyphilla.

Mœhringia muscosa.

- pendula.
- polygonoides.

Molinia cœrulea.

Molospermum cicutarium.

Molucella spinosa.

Moricandia arvensis. Mulgedium alpinum.

- Bourgaei.
- plumieri.
- sibiricum.

Muscari moschata.

Myosotis alpestris. bleu pur.

- à fl. blanches.
- azorica.
- palustris, bleu d'azur.
- Welwitchii.

Myrrhis odorata.

La Myrrhe, dont les racines sont fortement anisées.

Narcissus juncifolius.

» pseudo-narcissus.

Nardus stricta.

Nepeta Cataria.

- » Camphorata.
- Kokamirica.
- Nepetella.
- nuda.

Excellente pl. de rocailles.

- var. albiflora.
- parnassica.

Nothosmyrnium japonicum.

Omphalodes longiflora.

Onobrychis petræa.

Ononis fruticosa.

- natrix.
- rotundifolia.
- spinosa.

Onosma Helvetica.

» stellulatum.

Onothera macrocarpa.

- pumila.
- speciosa.

Opuntia (voir Cactées rustiques).

Origanum vulgare.

Ophiopogon Jaburan.

» Wallichianum.

Orobus canescens.

- lathyrioides.
- niger.
- tuberosus.
- vernus.

Osmorhiza japonica.

Oxalis acetosella.

Oxycoccus macrocarpa.

Oxyria digyna.

elatior.

Oxytropis Baïkalensis.

- campestris.
- deflexa.
- fœtida.
- Halleri.
- Lamberti.
- Lapponica.
- montana.
- ochroleuca.
- pilosa.
- sordida.
- spicata.
- sulfurea.

Pæderota Ageria.

» chamædrifolia.

Pæonia voir pl. vivaces.

Papaver alpinum.

alpinum var. à fl. rouge vif, rouge cinabre, roses et jaunes.

Ces pavots alpins sont d'entre les plus florifières, les plus gracieuses et les meilleures des plant. de roc.

Bonne pl. à fl. rouge brique, un peu envahissante et fleurissant de juin en hiver.

- Burseri.
- caucasicum.
- croceum.
- gariepinum.
- Heldreichii.
- nudicaule.
 - à fl. blanches doubles.
- » jaunes doubles.
- rouges doubles.
- blanches.
- jaune vif.
- rouges.
- rouge cramoisi.
- roses.
- soufrées.
- de teinte fumée.
- striée jaune et rouge. nudicaule. Toutes teintes mélang.

Le pap. nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les pl. alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers.

- pilosum.
- pinnatifidum.
- pyrenaicum.
- radicatum.
- Rhæticum.
- Rhæas.

Papaver rupifragum.

- » spicatum.
- » strictum. Belle esp. orientale.

Paradisia liliago.

Paracaryum angustifolium.

· liliastrum.

Lis de St-Bruno.

Paris quadrifolia.

Parnassia palustris.

Paronychia argentea.

- » Kapelæ.
- » nivea.
- » serpyllifolia.

Patriniahispida.

- , scabiosæfolia.
- » villosa.

Pedicularis atrorubens.

- » fasciculata.
- » foliosa.
- » hirsuta.
- » palustris.
- » rostrata.
- » tuberosa.
- verticillata.

Peltaria alliacea.

Penthorum chinensis.

» sedoides.

Petasites albus.

- » japonicus.
- » niveus.

Phaca alpina.

- » astragalina.
- » australis.
- frigida.

Phleum alpinum. Jolie graminée alpine.

Phoenixopus muralis.

Physalis alkekengi. Phyteuma austriaca.

- » betoniæfolium.
- ». canescens.
- » carestiæ.
- » Charmeli.
- » Halleri.
- » hemisphæricum.
- » Micheli.
- » limonifolium.
- » orbiculare.
- » Scheuchzeri.
- » Scorzonerifolium.
- » spicatum.

Picridium Anandrium.

Pimpinella magna rosea.

Pinus Cembro (Arolė).

Pour autres Pins, voir graines d'arbres.

Plantago alpina.

- » californica.
- » hirtella.
- » japonica.
- major atropurpurea.
- » monantha.
- » montana.
- » Patagonica.
- » sericea.
- » uniflora.

Pleurospermum austriacum.

Plumbago Larpentæ.

Poa alpina.

» cæsia.

Podophyllum Emodi.

» peltatum.

Polemonium boreale.

- » campanulatum.
- » cœruleum.
- Pl. mellifère, éminemment propre à orner un jardin; fl. bleues, très odorantes et se succédant sur la pl. de Juin en Sept.
- » confertum.
- » dissectum.
- » gracile.
- » flavum.
- » foliosissimum.
- » gracile.
- » grandiflorum.
- » Hymalayense.
- » humile.
- » mellitum.
- » pauciflorum.
- » reptans.
- » Richardsoni.
- Tanguticum.

Les Polémoines sont d'admirables pl. viv., formant de jolies touff. d'une verd. fine et gaie, et portant de beaux panicules de fl. bleues, blanch. ou jaunes, odorantes.

Pollya japonica.

Polygonatum biflorum.

- » giganteum.
- » humile.
- » multiflorum.
- » Thunbergi.
- » verticillatum.
- » vulgare.

Polygonum alpinum.

- » amplexicaule.
- » Bistorta.
- » Bistortioides.
- » capitatum.
- » filiferum.
- » lanuginerum.
- » multiflorum.
- » virginianum.
- » viviparum.

Potentilla abschasica.

- » adjarica.
- » alchemilloides.
- » alpestris.
- Fl. jaune vif, très nombreuses, mai-juillet.
- » ambigua.
- » apennina.
- » arachnoidea.
- » argentea.
- » arguta.
- » argyrophylla.
- Fl. d'un rouge ardent.
- » astrakanica.
- » atrosanguinea.

Très belle plante à fl. d'un rouge vif foncé, à feuillage odorant.

» aurea.

Potentilla Baldensis.

- Bornmülleri.
- canadensis.
- cataclines.
- chrysantha.

- Jolie fl. jaune clair.

 » delphinensis.
- Fenzlii. Fragiformis.

Belle espèce à feuillage velouté, se bronzant à l'automne.

- frigida.
- fruticosa.
- fulgens.

Superbe feuillage argenté.

- glandulosa.
- garypensis.
- gracilior.
- gracilis.
- grandiflora.
- heterophylla.
- Hippiana.

Beau feuillage argenté se bronzant à l'automne.

- Hookeriana.
- inclinata.
- Kleiniana.
- Kurdica.
- Leschenaultiana.
- minima.
- montenegrina.
- Mooniana.

Beau feuillage argenté.

multifida.

Pl. très rare des Alpes du Valais.

- tenella.
- Nepalensis.

Superbe esp. à fl. rose tendre veinées de carmin.

- Nuttali.
- obscura.
- pallida.
- pedemontana.
- pulcherrima.
- pyrenaica.
- recta.
- Romanzoffiana.
- rupestris.
- rupestris grandiflora
- ruthenica.
- Salesowiana.
- sanguisorbæfolia.
- speciosa.
- splendens.
- tanacetifolia.
- Thurberi.
- Thuringiaca.
- tridentata.
- trifurca.
- tuberosa.
- valesiaca.
- Visiani.

Poterium sanguisorba.

Prenanthes albus.

» purpurea.

Primula acaulis.

bleu intense.

Primula algida.

- Arctotis.
- auricula.
- auriculata.
- Balbisii.
- Bellunensis.
- Berninæ.
- capitata.
- carniolica.
- carpathica.
- cashmeriana.
- ciliata.
- Clusiana.
- confinis.
- cortusoides.
- denticulata.
- var. à fl. blanches.
- discolor.
- elatior.
- farinosa.
- var. à fl. blanches.
- floribunda (non rustique chez nous).
- frondosa.
- Forbesi.
- glaucescens.
- glutinosa.
- grandis.
- hirsuta.
- integrifolia.
- Japonica.

L'une des plus robustes, les hampes florales portent plusieurs tiges de fl. du carmin le plus vif. Elle aime l'humidité.

à fl. blanches.

- latifolia.
- leucophylla.
- longiflora.
- macrocalyx.
- magellanica.
- marginata.
- megasæfolia.
- minima.
- mollis.
- obconica (non rustique chez nous).
- cenensis.
- officinalis.

Fl. jaune orangé vif, odorantes, esp. très propre à émailler les prés et les pelouses.

- Parryi.
- pedemontana.
- Poissoni.
- Portæ.
- pubescens.
- Rhætica.

Bel hybride naturel des Alpes grisonnes.

Du rose le plus vif qui se puisse rêver.

- scottica.
- Sieboldi.
- Sikkimensis.
- similis.
- sordida.
- spectabilis.
- variabilis (les belles var. anglaises).

Primula venusta.

- veris (les meilleures var. anglaises).
- verticillata.
- villosa.
- viscosa.

La jolie Primevère carmin des Alpes granitiques.

Warei.

Prunella laciniata.

- grandiflora.
- vulgaris.

Pulmonaria angustifolia.

- azurea.
- mollis.
- rubra.

Puschkinia scilloides.

Pyrethrum anserinæfolium.

- » macrophyllum.
- niveum.
- parthenifolium.
- Starkianum.
- Tasso.

Pyrola rotundifolia.

» uniflora.

Ramonda pyrenaica.

Ranunculus aconitifolius.

- alpestris.
- amplexicaulis.))
- anemonoides.
- cardiophyllus.
- caucasicus.
- crenatus.
- glacialis.
- graminæuś.
- Illyricus.
- japonicus.
- Lingua (aquat.).
- millæfoliatus.
- montanus.
- parnassifolius.
- pennsylvanicus.
- platanifolius.
- Phthora.
- pyrenæus.
- rutæfolius.
- Seguieri.
- Thora.

Reseda complicata.

- fruticulosa.
- glauca.
- luteola.

Rhaponticum cinarioides.

- Heleniifolium.
- pulchrum.
- scariosum.

Rhinanthus hirsutus.

Rhodiola linifolia.

» ovata.

Rhodiola rubra.

- rosea.
- Scopoli.

Rhododendron chamæcistus.

- chrysantum.
- ferrugineum.
- hirsutum.

Rhododendron hirsutum à fl. blanches.

- intermedium.
- Kamtschaticum.
- myrtifolium.

Rodgersia podophylla.

Romanzoffia Sitchensis.

Roripa pyrenaica.

Rotala lanuginosa.

Rosa alpina (voir arbrisseaux).

Rubus arcticus.

Délicieuse framboise des régions boréales à la fl. rose vif, au port nain et au feuillage rougissant l'automne.

» saxatilis.

Rumex alpinus.

- nepalensis.
- occidentalis.
- salicifolius.
- venosus.

Ruta graveolens.

» montana.

Sabbatia campestris.

Sagina Linnæi.

- glabra.
- » maxima.

Salix reticulata.

- retusa.
- serpyllifolia.

Salvia acaulis.

- austriaca.
- domenica.
- glutinosa, sauge à fl. jaunes.
 - \sim sclarea.
- pratensis.
- Sclarea.
- spathacea.
- sylvestris.
- verbenacea.
- verticillata.
- virgata.

Sambucus racemosa.

Le sureau corail.

Samolus floribundus.

» Valerandi.

Sanguinaria canadensis.

Sanguisorba canadensis.

dodecandra.

Sanicula arctopoides. bipinnatifida.

- elata.
- europea.
- Marylandica.
- Menziesii.

Saponaria bellidifolia.

- cæspitosa.
- glutinosa. >>
- lutea.
 - officinalis.
- ocymoides.
- v. splendens.

La sap. ocym. est l'une des meilleures des pl. de rocailles; elle croît au soleil, retombe gracieusement et se recouvre, en mai-juillet, de nombreuses fl. roses.

Satureya montana.

pygmæa.

Saussurea alpina.

- » crassifolia.
- » decurrens.
- » depressa.
- » discolor.

Saxifraga du groupe Bergenia.

Fl. grandes, épaisses, a fl. roses ou blanchâtres.

- » cordifolia.
- » crassifolia.
- » ligulata.
- » » ciliata.
- » Stracheyi.
- » aizoides.
- » aconitifolia.
- » Aizoon.
- » » brevifolia.
- » » gracilis.
- » » minor.
- » » nepalensis.
- » » robusta.
- » ajugæfolia.
- » Allionii.
- » altissima.
- » anceps.
- » androsacea.
- » angulosa.
- » apennina.
- » aquatica.
- » aretioides.
- » aspera.
- » atropurpurea.
- » australis.
- » biflora.
- » bronchialis.
- » bryoides.
- » Burseriana.
- » v. grandiflora.
- » cæsia.
- » cæspitosa.
- » canaliculata.
- » capitata.
- » carinthiaca.
- » carpathica.
- » cartilaginea.
- » catalaunica.
- » cernua.
- » circinata.
- » coniferæ.
- » coroyphylla.
- » Cotyledon.
- » crustata.
- » cultrata.
- » cuneifolia.
- » Curchilli.
- » Cymbalaria.
- » decipiens.
- » demissa.
- » diapensioides.
- » dubia.
- » elatior.
- » Engleri.
- » exarata.
- » flavescens.
- » Forbesi.

Saxifraga Friedrich-Augusti.

- » Gaudini.
- » genuina.
- » geranioides.
- » Geum.
- » Gibraltarica.
- » granulata.
- » Heucherifolia.
- » hibernica.
- » Hirculus.
- » Hostei.
- » Huetti.
- » hypnoides.
- » intacta.
- » integrifolia.
- » intermedia.
- » Kolenatiana.
- » Kotschyi.
- » læta.
- » La Graveana.
- » lanceolata.
- » lantoscana.
- » lasiophylla.
- » leucanthemifolia.
- » linguæformis.
- » lingulata.
- » longifolia.
- » luteo-viridis.
- » malyi.
- » marginata
- » muretti.
- » nivalis.
- » notata.
- » odontophylla.
- » oppositifolia.
- » palmata.
- » pectinata.
- » pedemontana.
- » peltata.
- » pensylvanica.
- » planifolia.
- » portæ.
- » pseudo-sancta.
- » pubescens.
- » punctata.
- » regelii.
- » retusa.
- » rhætica.
- » rhei.
- » rivularis.
- » rocheliana.
- » rotundifolia.
 - var-glandulosa.
 - » » repanda.
- » sancta
- » sarmentosa.
- » scardica.
- » seguieri.
- » sempervivum.
- » sponhemica.
- » squarrosa
- » Stabiana.
- » stellaris.
- » stenoglossa.

Saxifraga stenopetala.

- » sturmiana.
- » tenella.
- » tiroliensis.
- » tricuspidata.
- » trydactilytes.
- » umbrosa (Désespoir du peintre.)
- » » var Colvillei.
- » varians,
- » virginica.
- » wettsteinii.
- » whitlawi.
- » zeleborii.
- » zimmeterii.

Germent avec facilité, mais à cause de l'extrême ténuité de leurs graines, il faut soigner les semis et ne pas arroser trop fort. Il est bon de ne pas recouvrir les gr. et de semer à la surface du sol.

Scabiosa caucasica.

- » alba.
- » graminifolia.
- » lucida.

Schivereckia podolica. Scilla (v. pl. vivaces.)

Scopolia carniolica.

» japonica.

Scorzonera austriaca.

» purpurea.

Scrophularia alata.

- » hoppii.
- » juratense.
- » nodosa.
- » oldhami.
- » pyrenaica.

Scutellaria alpina.

» » à fl. blanches.

La Scut. alp. est une excell. pl. traînante à fl. bleulilas et blanc chez le type, très robuste et florifère.

Sedum acre.

- » aizoon.
- » album.
- » anacampseros.
- » annuum.
- » asiaticum.
- » carpathicum.
- » cœruleum.
- » dasyphyllum.
- » eversii.
- » fabaria.
- » glaucum.
- » Hispanicum.
- » bithynicum.
- » involucratum.
- » kamtschaticum.

Esp. très florif., à fl. jaune d'or.

- » lehmanni.
- » lydium.
- » maximowiczii.
- » maximum.
- » micranthum.
- » middendorfii.
- » olympicum.
- » pallidum.
- » populifolium.

Sedum purpurescens.

- » reflexum.
- » Rhodiola (voir Rhodiola).
- » rupestre.
- » selskianum.
- » sieboldi (type).
- » spectabile.
- » spurium.
- » stenopetalum.
- » telephium.
- » turkestanicum.
- » villosum.
- » wallichianum.

Sempervivum acuminatum.

- » arachnoideum.
- » bourgeanum.
- » caucasicum.
- » ciliosum.
- » comoli.
- » flagelliforme.
- » funkii.
- » gaudini.
- » heuffeli.
- » kapaornikense.
- » latifolium.
- » mettenianum.
- » montanum.
 - patens.
- » pittonii.
- » pomelii.
- » reginæ Amaliæ.
- » robustum.
- » tectorum.
- » violaceum.
- » webbianum.
- » wulfenii.

Senecio abrotanifolius.

- » adonidifolius.
- » ætnensis.
- » alpinus.
- » angustifolius.
- » artemisiæfolius.
- » aurantiacus.
- » biebersteinii.
- » campestris.
- » carniolicus.
- » cassinioides.
- » cordatus.
- coriaceus.cruentus.
- » diversifolius.
- » doria.
- » doronicum.

C'est le beau « Soleil d'or » des Alpes, à capitules orangés; pl. très brillante et aimant le soleil et la rocaille.

- » farfaræfolius.
- » incanus.
- » jacquinianus.
- » macrophyllus.
- » palmatus.
- » nebrodensis.
- » nemorensis.
- » pulcher.

Senecio sarracenicus.

- sibiricus.
- subalpinus.
- tyrolense.
- uniflorus.
- zuccharini.

Serratula coronata.

» Vulpii.

Sibbaldia cuneata.

- maxima.
- parviflora.
 - procumbens.

Sidalcea candida.

- delphinifolia.
- malvæflora.
- oregana.
- spicata.

Sideritis hyssopifolia.

Jolie Labiée naine et touffue à fl. jaune soufre.

Silene acaulis.

- alpestris.
- alpina.
-)) armeria.
- biflora.
- bryoides.
- ciliata.
- correvoniana.
- fabaria.
- fimbriata.
- fruticulosa.
- græfferi.
- maritima.
- melandriformis.
- monachorum.
- multicaulis.
- muscipula.
- nutans.
- otites.
- pumilio.
- pygmæa.
- quadrifida.
- reichenbachiana.
- rœmeri.
- rupestris.
- rupicola.
- saxifraga.
- schafta.

L'une des rares fl. d'automne; fl. d'un carmin vif; cult.

- valesia.
- viscosa.
- zawadsky.

Sissimbrium strictissimum. Smilacina amplexicaulis.

- racemosa.
- stellata.

Sobolewskya clavata. Solanum Dulcamara.

Soldanella alpina.

- » minima.
- » pyrolæfolia.

Solenanthus apenninus.

Solidago alpestris.

» lithospermifolia.

Solidago puberula.

» Riddeli.

Specularia Speculum.

Spiræa Aruncus.

La superbe Reine des bois aux grands panicules blancs.

- filipendula.
- Ulmaria.

Stachys lanata.

» plumosa.

Stipa gigantea.

» pennata.

Stobæa radula.

Streptopus amplexifolius.

Swertia connata

- cordata.
- longifolia.
- multicaulis.
- paniculata.
- perennis.
- punctata.

Sylibum marianum.

Symphiandra Hoffmanni.

Campanulacée à fl. blanches, très florif. et propre à garnir les lieux frais.

Symphiandra pendula.

Symphitum officinale.

Talinum reflexum.

Tamus communis.

Bonne pl. grimpante propr. aux lieux ombrag., aux sousbois, etc., se garnissant de baies écarlates à l'aut.

Tanacetum boreale.

- kotschvi.
- macrophyllum. D
- niveum.
- vulgare.

Taraxacum officinale. album.

corniculatum.

Telekia speciosa.

Très belle Composée à grandes formes et à capitules orangés, fleurissant d'août en oct.

Telephium Imperati.

orientale.

Tellima grandiflora.

Teucrium chamædrys.

- japonicum. lucidum.
- montanum.
- polium.
- Scorodonia.

Thalictrum aquilegifolium.

Le délicat Pigamon aux élégants panicules lilas.

- panicules lilas à fl. blanches.
- anemonoides.
- Baïkalense.
- cornuti.
- Delavayi.
- Fendleri.
- fœtidum.
- minus.

Jolie verdure fine et gracieuse.

- purpurascens.
- saxatile.
- trigynum.

Thlaspi Avellanæ.

Kotschyanum.

Thlaspi præcox.

- » rotundifolium.
- » violascens.

Tiarella cordifolia.

Tofieldia calyculata.

- » glacialis.
- » japonica.

Tommasinia purpurascens.

» verticillaris.

Tragopogon ruber.

Trientalis europea.

Délicieuse Primulacée qui recherche l'ombre.

Trifolium alpinum.

- » Badium.
- » montanum.
- » spadiceum.

Triglochin palustre.

Trigonotis peduncularis.

Trillium atropurpureum.

- » grandiflorum.
- » pendulum.

Trochyscanthes nodiflorus.

Trollius altaicus.

- » asiaticus.
- » aurantiacus.
- » caltheoides.
- » caucasicus.
- » dsungaricus.

» europæus.

Le beau « Globe d'or » des rég. mont. qu'on élève et cultive facilement. Il fleurit abond. si on lui donne un sol sain et une situation un peu fraîche. On en fait aussi de merveilleux bords d'étangs ou ruisseaux.

- hybridus.
- » japonicus.
- » napellifolius.
- » patulus.

Tunica saxifraga.

Typha latifolia.

Umbilicus semenovi (voir en outre Cotyledon).

Vaccinium (voir arbustes).

Valeriana alliariæfolia.

- » alpestris.
- » celtica.
- » edulis.
- » exaltata.» flaccidissima.
- » globulariæfolia.
- » montana.
- » officinalis.
- » Phu.
- » pyrenaica.
- » sambucifolia.
- saxatilis.

Valeriana septentrionalis.

» tripteris.

Veratrum album.

Le Vératre est une belle pl. aux formes architectur. qui a grand air dans une campagne pittoresque et dans une rocaille.

- » californicum.
- » Lobelianum.
- » nigrum.

Verbascum Blattaria.

» Hænkei.

Verbascum montanum.

- » Olympicum.
- » Phœniceum.
- » Thapsus à fl. blanches.

Veronica Allionii.

- » alpina.
- » aphylla.
- » Bachofenii.
- » bellidioides.
- » Chamædrys.
- » fruticulosa.
- gentianoides.
- » incana.
- incisa.
- » Jacquini.
- » multifida.
- » orientalis.
- » peduncularis.
- » prostata.
- » satureyoides.
- » saxatilis.

L'une des meilleures pl. de rocailles; aime le soleil.

- » serpyllifolia.
- » sibirica.
- » spicata.
- » à fl. blanches.
- » stenophylla.
- » Teucrium.
- » urticæfolia.

Vesicaria montana.

- » sinuata.
- » utriculata.

à planter dans les fentes de rochers.

Vicia dumetorum.

- » Orobus.
- » tenuifolia.

Vinca major.

» minor.

Viola ætholica.

- adunca.alpestris.
- » alsophylla.
- » altaica.
- » arenaria.

Viola Banatica.

- biflora.
- » calcarata.
- » canadensis.
- » canina.
- » cenisia.
- » cognata.
- » cornuta.
 - » à fl. blanches.
- » declinata.
- » delphinifolia.
- » elatior.
- » Jovi.
- » lancifolia.
- » latisepala.
- » lutea.
- » macedonica.
- » mumbyana.
- » Nuttali.
- » palmata.

Viola palustris.

- patrini.
- pedatifida.
- pinnata.
- pinnatifida. polychroma. prionantha.
- rothomagensis.
- stagnina.

Viola sudetica.

- » sylvestris grypoceras.
- tricolor.

(la petite pensée des champs).

» Zoyzii.

Vittadenia triloba.

Wahlbergella affinis.

» pauciflora.

Wulfenia carinthiaca.

Graines de plantes vivaces d'ornement.

Pour les plantes vivaces.

Les plantes vivaces, qui furent les premières fleurs que l'on introduisit dans les jardins, ont été refoulées à l'arrière-plan par les brillantes exotiques pour lesquelles on a dû construire des serres et des couches chaudes et qu'on a dû acclimater à force de frais et de soins. Abandonnées par le gros public, elles sont restées l'apanage des gens de goût et des amateurs de belles choses ; les artistes, les lit-térateurs, les amis du Beau et du Vrai reviennent aux plantes vivaces avec une ferveur digne de remarque. Ce sont elles qui envahissent l'atelier du peintre et le cabinet de l'homme de lettres. Et ce sont les plantes vivaces, ces bonnes filles des zones froides ou tempérées, enfants souvent des frimas et des monts, qui servent les dessins de l'architecte paysagiste de notre époque. On en a assez des mosaïcultures qui sont une aberration du bon goût et la négation de l'art; on ne veut plus de ces corbeilles multi ou unicolores, gros pâtés colorés qui offusquent la vue de celui qui voue un culte aux belles choses ou au naturel. On leur préfère l'élégante silhouette d'une plante herbacée vivace dont les fleurs solides et innombrables sont une précieuse ressource pour les bouquets ou l'arrangement des intérieurs.

Inondez vos salons et vos chambres de travail de ces flots colorés et parfumés; que les fleurs animent vos maisons et poétisent votre existence et que, chaque jour, leurs charmes discrets élèvent vos âmes

et agrémentent votre existence.

Pour cela, plantez d'espèces vivaces vos plates-bandes et vos massifs; détruisez les corbeilles monstrueuses et animez vos pelouses en plantant, ici et là, des touffes d'Anémones, d'Asters, de Kniphophias, de Delphinium, de Rudbeckias, etc.; plantez partout de ces bonnes plantes vivaces qui ne demandent rien sinon qu'on coupe leurs tiges à l'automne et qu'on les laisse vivre en paix, donnant à foison fleurs et parfums sans rien exiger du jardinier.

Acanthus mollis.

- » spinosus.
- spinosissimus.

Achillea ageratum.

filipendula.

Mille-feuilles à fleurs jaunes.

Aconitum variegatum.

à fl. blanches.

Actinomeris Helianthoides.

» pauciflora.

Adenophora communis.

- » denticulata.
- liliifolia.
- Potanini.
- verticillata.

Agraphis nutans.

Agrostemma coronaria.

(Coquelourde, plante très florifère et solide, à nombreuses fleurs d'un carmin vif.)

Alfredia cernua.

- nivea.
- stenolepsis.

Althæa ficifolia (fl. jaune soufre).

Rose trémière à fl. simples, var. à fl. blanches, jaunes, blanc crème, roses, rouges ou brunes.

Alyssum saxatile (Corbeille d'or).

v. compactum.

- Amsonia elliptica.
 - » latifolia.
 - salicifolia.

Anaphalis margaritacea.

» Jedænsis.

Anchusa Barrelieri.

- italica.
- ochroleuca.
- officinalis.
- sempervirens.

Anemone coronaria.

- hortensis.
- japonica.
- sylvestris à grandes fleurs. (Très belle esp. de cult. facile.)

Angelica officinalis.

Antirrhinum majus (Gueule de loup).

» var. atrosanguinea.

Anisodus luridus.

Apocynum venetum.

Aquilegia alba (Ancolie blanche).

- » californica (rouge et jaune).
- » » à fleurs blanches.
- » canadensis.
- » nana.

Nombreuses fleurs d'un beau rouge cinabre.

» chrysantha.

Fleurs jaunes à très longs éperons.

- » chrysantha bicolor.
- » » nana.
- » cœrulea.

L'une des plus merveilleuses fl. que nous ait donné l'Amérique.

- » cœrulea lutea.
- » flabellata nana.

Pl. japonaise naine à nombreuses fl. blanches; très précoce.

- » glandulosa.
 - » bicolor.
- » » cœrulea.
- » v rosea.
- » violacea.

Charmantes variétés, très florifères.

Aquilegia Haylodgensis.

Très belles variétés anglaises à grandes fl. multicolores.

» hybrida.

Var. à grandes fl. de teintes très variées et brillantes.

» jucunda.

A fl. roses; très belle espèce.

- » Jetschani, fl. rouge et jaune.
- » vulgaris.

Les Ancolies sont excell. pour la garnit. des endroits frais, des sous-bois, pour émailler les pelouses, pour plate-bandes ou rochers. Leur abondante floraison, l'élégance de leurs fl., leurs couleurs vives et variées, et surtout le fait qu'elles sont robustes et de cult. extrêmement simple les recommandent à tous. Leurs graines germent de suite.

Arabis albida (corbeille d'argent).

Aralia cachemiriana.

- » chinensis.
- » edulis.
- » racemosa.

Archangelica officinalis.

Aristolochia Clematitis.

Arnebia echioides.

Artemisia Dracunculus (Estragon).

» Gnaphalioides.

Armeria cephalotes alba.

» speciosa.

Arum italicum.

Asclepias Cornuti.

» incarnata.

Asclepias purpurascens.

- » speciosa.
- » tuberosa.

Bonnes plantes vivaces florif. et solides.

Ascyrum Crux Andræ.

» stans.

Asparagus acutifolius.

» verticillatus.

Asphodelus albus.

Asphodelus cerasiferus.

- » fistulosus.
- » luteus.
- » liburnicus.
- » microcarpus.
- » ramosus.

Les Asphodèles sont de précieuses pl. pour l'ornementation des jardins.

Aster adulterrinus.

» bessarabicus.

Très belle espèce à nombreuses fl. bleu et or..

- » cassubicus.
- » curtisii.
- » cyaneus.
- » eminens.
- » ericoides.
- » japonicus.
- » laevis.
- » leucanthemus.
- » maacki.
- » microcephalus.
- » Nan Shanicus.
- » nanus.
- » novi belgii.
- » » à fl. blanches.
- » ptarmicoides.
- » pumilius.
- » puniceus.
- » scaber.
- » sibiricus.
- » Sikkimensis.
- » simplex.
- » spectabilis.
- » tataricus.
- » tripolium.
- » turbinellus.

Astilbe japonica.

- » rivularis.
- » Thunbergi.

Audibertia humilis.

- » polystachya.
- » stachvoides.

Baptisia australis.

» exaltata.

Bellevalia romana.

Bigelovia graveolens.

Blepharipappus plattiglossus.

Bocconia (Macclaya) cordata.

- » japonica.
- » microcarpa.

Borago officinalis.

Botryanthus ruthenicus.

Bryonia dioica (grimpante).

Bupleurum fruticosum.

Cacalia tuberosa.

Cakile maritima

Caccinia glauca.

Callimeris (Aster) incisa.

Callirhoe involucrata.

- » pedata.
- » verticillata.

Calystegia dahurica, liseron rose vivace. Camassia esculenta.

» Cusickii.

Camassia Fraseri.

Campanula Alliariæfolia.

Belle pl. à grandes fl. blanches, penchées, formes élégantes.

» carpathica.

(Excellente pour bordures et former des tapis.)

» » à fl. blanches.

» cephalantha.

» eryocarpa.

Très belle et grande esp. à grandes fl. bleu-violet.

» glomerata.

» var. speciosa.

» haylodgensis.

» lamiifolia.

Pl. de taille moyenne à grandes et nombreuses fl. blanches.

» latifolia.

» » à fl. blanches.

Excell. pl. à flor. prolongée.

» latifolia versicolor.

» latiloba.

Excell. pl. vivace à floraison prol.; fl. bleu clair.

» læfflingii.

» loreyi.

» macrantha.

Espèce à très grandes fleurs.

macrostyla.

» Medium. (Camp. carillon; bisann.)

» var. calycantha.

» nobilis.

» nobili-macrantha.

» patula.

» pelviformis (Hort.).

» persicæfolia.

» pilosa.

» primulæfolia.

» punctata.

» pyramidalis.

Pl. excellente pour garnir les vieux murs, les grands rochers, les graviers, les pentes arides, au soleil. Elle fleurit de juillet-août en novembre et constitue une des meilleures pl. d'ornement dans les jardins alpins ou les plates-bandes. Culture facile.

Camp. pyramidalis à fl. blanches.

» rapunculoides.

» Rapunculus.

» sibirica.

» speculum (Specularia).

» strigosa.

» Trachelium.

» à fl. pleines.

» turbinata.

Bonne espèce naine, florif.

» urticifolia.

» Van Houttei.

» vernalis.

Catananche cærulea.

Celsia pontica.

Centaurea Babylonica.

Très haute espèce fl. jaune orangé.

» macrocephala.

Bonne espèce à gros capitules jaunes.

» Margaritæ.

» suaveolens.

Centranthus longiflorus.

Centranthus ruber.

C'est la Barbe de Jupiter ou Valériane rouge vif, l'une des plus recommandables pl. d'ornement. Fait admirablement dans les fentes des murailles.

» ruber à fl. blanches.

» » à fl. rouge très foncé.

Chamæpeuce diacantha.

» nivea.

» stellata.

Cheiranthus Cheiri semperflorens.

Chelone barbata.

» coccinea.

» » hybrida.

» Lyoni.

» obliqua.

» v. à fl. blanches.

Torreyi.

Les Chélones sont d'excellentes pl. vivaces aux fl. rouge vermillon ou carmin ou rose, etc., de culture facile et dont les graines germent avec facilité.

Chrysanthemum Decaisneanum.

» lacustre.

» marginatum.

» maximum.

» nipponicum.

» Satsuense.

» sinense flor. pl.

Chrysopsis villosa.

Clematis integrifolia.

L'ancienne Clématite herbacée et vivace à grandes fl. bleues des jardins de nos pères.

recta, fl. blanches, enpanicules.

Clematis tubulosa.

Commelina coelestris.

» communis.

» tuberosa.

Convolvulus cantabricus.

» althæoides.

». mauritanicus. fl. lilas.

» soldanella.

Coreopsis auriculata.

» grandiflora.

lanceolata.senifolia.

» trichosperma.

tripteris.

Excellentes pl. d'ornem. très florifères; fl. grandes, d'un jaune vif, se succédant de juillet en novembre. Cult. facile.

Cosmanthus rigidus. Crambe cordifolia.

» aspera.

» maritima.

» pinnatifida.

Crucianella stylosa.

Cucurbita perennis.

Cynoglossum nervosum.

Datura Stramonium.

» Fastuosa.

» gigantea.

» Tatula.

Pl. annuelles à semer dans les décombres ou sur les terraux pour les orner.

Delphinium altissimum.

» amœnum.

Delphinium ajacis (pl. annuelle).

- » azureum.
- » var. albidum.
- » bicolor.
- » californicum.
- » crassicaule.
- » consolida (annuelle).
- » » de plusieurs couleurs.
- » elatum.
- » exaltatum.
- » Formosum (esp. superbe).
- » grandiflorum.
- » à fl. blanches.

Le D. grandif. est l'une des plus belles esp. du genre.

» hybridum.

Mélange des meilleures variétés.

- » intermedium.
- » laxiflorum.
- » nudicaule (rouge vermillon).
- » Parryi.
- » speciosum.
- » vestitum.
- » zalil (jaune soufre).

Les Dauphinelles ou pieds d'alouettes vivaces sont d'entre les meill. de nos pl. d'ornement. Cult. facile et flor. prolongée si l'on a soin de couper les tiges après la floraison.

Dianthus plumarius.

Excellente pl. pour garnir les talus, les murs, les rochers, les lieux arides; fl. abondantes et très odor. se succédant tout l'été. Elle s'élève facilement de graines.

» var. Cyclope.» scotticus.

Dicentra eximia.

Dictamnus albus.

» Fraxinella. (Burning Bush.)

Digitalis lutea.

- » purpurea.
- » purpurea alba.

Les Digitales sont de bonnes pl. à fl. nombreuses en grappes dressées; cult. facile.

Dipplostephium salicifolium.

Echinacea intermedia.

» purpurea.

Excellente pl. vivace, s'élevant de 60 à 80 cm. et produisant pendant cinq ou six mois de grandes marguerites d'un rouge vin foncé; bonne p. les bouquets.

Echinops Bannaticus.

» Ritro.

(Gros chardon bleu de forme sphérique.)

- » humilis.
- » spherocephalus.

Echmocystis lobata.

Elymus arenarius.

(Graminée vivace à feuillage bleuâtre.)

Eremostachys laciniata.

» iberica.

Eremurus altaicus.

» Kaufmanni.

Eremurus robustus.

Gigantesque Jacinthe d'Orient, portant de mai-juillet, des hampes defl. roses de 2½ et même 3 mètres de haut. Cult. facile; soleil.

- » spectabilis.
- » turkestanicus.

Erigeron glabellus.

Erigeron Philadelphicus.

» speciosus.

Grand aster bleu vivace.

Eryngium alpinum.

La plus belle et la plus ornementale des pl. alpines.

» giganteum.

Pl. de teinte gris plomb.

» creticum.

Involucre, épis et tiges bleu foncé.

- » olivieranum.
- » maritimum.
- » planum.

Fl., involucres et tiges d'un bleu violacé; on la sèche pour bouquets d'hiver.

» Rothenbergii.

Tous ces Eryngium ont l'aspect de Chardon bleus, bien qu'ils appartiennent aux ombellifères. Ce sont d'excellentes pl. d'ornement, propres à garnir les lieux arides.

Erysimum versicolor.

Eschscholzia aurantiaca.

Papavéracée bisannuelle et très florifère qui se sème naturellement dans les plates-bandes ou les graviers et fleurit toute l'année, même l'hiver quand il n'est pas très rigoureux.

Eupatorium ageratoides.

Bonne pl. viv. à fl. blanc pur; florais. prolongée; cult. facile.

- » album.
- » altissimum.
- » aromaticum.
- » chinense.
- » grandiflorum.
- » Japonicum.
- » Kirilovi.
- » purpureum.
- » striatum.
- » verticillatum.

Grands ombelles de fl. blanc d'un violet pourpre. Cult facile.

» violaceum.

Farsetia clypeata.

Felicia abyssinica.

» fragilis.

Ferula Asa fœtida.

- » communis.
- » Ferulago.
- » glauca.
- » Narthex.» nodiflora.
- » orientalis.
- » Sumbul.
- » sylvatica.
- » thyrsiflora.

Feuillages très finement divisés et décoratifs.

Francoa appendiculata.

- » ramosa.
- » sonchifolia.

Fritillaria Imperialis.

Funkia cœrulea.

- » ovata.
- » Sieboldi.

Belles pl. d'ornement cultivées souvent sous le nom d'Hémérocalles.

Gaillardia aurantiaca.

- » grandiflora.
- » variétés mélangées.

Gaillardia maxima.

- » · v rubra.
- » picta.
- » pulchella.

Les Gaillàrdes sont d'excellentes plantes d'ornement, à grandes fl. jaune et rouge, fleurissent abondamment tout l'été.

Galatella linifolia. Galega officinalis.

- » à fl. blanches.
- » orientalis.
- » persica.

Solides Papilionacées à floraison prolongée.

Galtonia candicans.

Grande Jacynthe vivace à fl. blanc pur.

Gaura Lindheimeri.

Excellente pl. d'ornement qui fleurit pendant tout l'été.

Geranium pratense.

Bonne espèce très rustique et florifère.

Geum coccineum.

Superbe pl. à fl. d'un rouge vermillon.

- » cocc. var. atrosanguineum.
- » var. à fl. doubles.
- » Heldelchii.

Ces Benoîtes, à fl. rouge vif, sont de semis et cult. faciles, et réussissent bien dans les sols sains, fleurissent de mai en octobre.

Gillenia trifoliata.

Gladiolus communis.

- » Gandavensis.
- » segetum.

Glaucium corniculatum.

- » luteum.
- » rubrum.
- » tricolor.

Grindelia cuneifolia.

- » humilis.
- » inuloides.
- » patens.
- » rubricaulis.

Très belles composées à grands capitules jaune soufre: excellentes pl. d'ornement et bonnes pour bouquets.

Gunnera Chilensis.

» scabra.

Gutierrezzia Euthamiæ.

Gypsophila paniculata.

» scorzoneræfolia.

Hebenstretia comosa.

» serratifolia.

Hedysarum coronatum.

Heleniastrum puberulum.

Helenium autumnale.

- ». Bigelowi.
- » commutatum.
- », Hoopesii.

C'est l'une des plus brillantes, des plus florif. et des meilleures d'entre les pl. vivaces. Grands capitules couleur orangé vif.

Helianthella quinquænervis.

Helianthemum mélangés de toutes couleurs.

Excellentes pl. basses, très florif., dont nous avons une collection complète (voir p. 10). Il en est de toutes teintes et couleurs. Elles sont faciles à élever de gr. et très ornementales.

Helianthus californicus.

» Dammanus.

Helianthus maximilianus.

- » pumilus.
- » rigidus.
 - » stummosus.

Heliopsis lævis.

» scabra.

Helleborus colchicus. Rose de Noël à fl. cuivrée.

» niger (Rose de Noël).

Helleborus orientalis vars.

Ces Héllébores, à fl. blanches, roses, rouges ou cuivrées apparaissent dans les premiers jours de mars et sont précieuses dans un moment où le jardin n'a pas de fleurs.

Helichrysum angustifolium.

Hemerocallis Middendorfianum.

» fulva.

Heracleum giganteum.

- » lanatum.
- » Leichtlini.
- » Mantegazzianum. Superbe espèce (voir p. 11).
- » à fleurs roses.
- » à feuilles panachées.
- » montanum.
- » orientale.
- » Persicum.
- » pubescens.
- » Wilhelmshii.
- » villosum.

Les Her. sont des pl. d'ornement aux formes architecturales et propres à garnir les lieux sauvages et pittoresques. Ils aiment la fraîcheur et la mi-ombre.

Hesperis matronalis. (Girarde).

Heuchera sanguinea.

» var splendens.

Hisbiscus palustris.

- » roseus.
- » splendens.

Superbe pl. d'ornement aux très grandes fl. roses.

Humulus Lupulus (Houblon).

Hypericum calycinum.

Millepertuis vivace et rampant à beau feuillage persistant et grandes fleurs jaunes aux myriades d'étamines.

Hypericum Gebleri. Belle espèce très robuste.

» Hookerianum.

Hyssopus officinalis.

- » » à fl. blanches.
- » à fl. rouges.

Iberis Gibraltarica hybrida.

Très bonnes pl. à fl. lilas ou blanches, excellentes pour la décoration des rochers ou des vieux murs.

Impatiens granduligera.

Balsamine carmin de l'Himalaya.

Incarvillea Delavayi.

- » Olgæ.
- » variabilis.

Inula glandulosa. L'une des meilleures pl. vivaces.

» Helenium.

C'est l'Aulnée des médecins ; sa racine est le meilleur remède pour les maladies d'estomac. Comme telle elle se vend très cher sur le marché de Genève.

» macrocephala.

Ipomæa leptophylla.

» pandurata.

Beau liseron vivace très rare dans les cult.

Iris albo-purpurea.

» albida.

26 Iris aphylla. bracteata. chamæiris. correana. Douglasiana. ensata. v. chinensis. fœtidissima. furcata. germanica. va. purpurea. lævigata. lutescens. missouriensis. monantha. Monnieri. orientalis. pallida. persica. pseudo-acorus. pseudo-cyperus. pumila. pyrenaica. sibirica. Jolie pl. aux nombreuses fl. bleu foncé. v. fl. alte cœrulea. v. orientalis. v. à fl. blanches. spectabilis. » squalens. stenogyna. versicolor. virginica. Xyphium. Isatis tinctoria. Ixia Bulbocodium. Ixiolyrion montana. » v. brachiantherum. v. Ledebouri. » v. Pallasi. Lathyrus angustifolius. aureus. latifolius. (Pois à fl. vivace.) à fl. blanches. à fl. rouges. versicolor. sphæricus. Lavandula spica. Stækas. vera. » à fl. blanches. La Lavande se cultive au soleil et au sec.

Lepachys columnaris.

» purpurea. Leucojum æstivum.

» vernum (niveole).

Liatris punctata.

» pycnostachya.

scariosa.

spicata.

Libertia grandiflora: Ligularia macrophylla.

sibirica.

speciosa.

Lilium candidum.

Glehni.

Gravi.

pomponium.

superbum.

tigrinum.

Lindelofia spectabilis.

Linum perenne.

à fl. blanches.

à fl. roses.

Les Linum pereine sont de délicieuses pl. à floraison gracieuse et presque permanente; cult. facile.

sibiricum.

» à fl. blanches.

à fl. roses.

Lobelia cardinalis.

Kamtschatica.

sessiliflora.

speciosa.

syphilitica.

tenuior.

Lophantus anisatus.

Labiée à la forte odeur d'anis.

» rugosus.

Lunaria bienis.

». à fl. blanches.

(Monnaie du Pape.)

Lychnis chalcedonica.

L'ancienne et toujours belle Croix de Malte ; d'un rouge vermillon.

chalcedonica à fl. blanches.

à fl. roses.

fulgens.

Fl. grandes et brillantes; culture facile; belle pl. ornementale.

grandiflora.

Haageana. Fl. rose-saumon.

Preslii.

Sibirica.

Sieboldi.

Viscaria.

var. à fl. blanches.

var. splendens.

Les Lychnis sont de bonnes pl. d'ornement très florifères. Ils s'élèvent avec facilité par semis et sont de culture très aisée.

Lysimachia acrodænia.

atropurpurea.

ciliata.

ephemerum.

longifolia.

quadrifolia.

verticillata.

Maclaya cordata.

» microcarpa.

Connues également sous le nom de Bocconia, ces pl. sont d'entre les meilleures pl. vivaces à feuillage ornemental. Elles font merveille, isolées dans les pelouses ou pour la décoration des jardins pittoresques.

Mandragora officinalis (La Mandragore).

Matthiola fenestralis.

» incana.

Matthiola sinuata.

» tristis.

Mertensia lanceolata.

Mertensia paniculata.

- » sibirica.
- » virginica.

Michauxia campanuloides.

Micrampelis Fabacea.

Mimulus cardinalis.

Musc à grandes fl. écarlates; très florifère.

- » Burneti.
- » cupreus.
- » luteus.
- » Tillingii.

Monarda dydima.

- » dydima à fl. blanches.
- » fistulosa (thé d'Oswego).
- » Kalmiana.
- purpurea.

Les Monardes sont d'excellentes pl. vivaces, odoriférantes, très rustiques et florifères; fleurs ornementales et bonnes pour les bouquets.

Monardella citriodora.

- » lanceolata.
- villosa.

Morina Coulteriana.

» longiflora.

Belle pl. décorative à l'aspect d'acanthe, aux beaux épis de fl. roses, se succédant pendant tout l'été.

Mulgedium Bourgæi.

Superbe pl. vivace à grandes formes et à beaux panicules de fl. bleues.

» macrophyllum.

Laitue vivace à grandes fl. bleues.

Nepeta grandiflora.

- » macrantha.
- » nuda.
- » à fl. blanches.

Les Nepeta sont de belles pl. aromatiques aux fl. très nombreuses, bleues, violettes et blanches.

Nuphar luteum (Nénuphar jaune).

Nymphæa alba.

(Lis des étangs ou nénuphar.)

Obeliscaria columnaris.

- » pinnata.
- » pulcherrima.

Onothera arguta.

- » biennis var. grandiflora.
 - » à fl. blanches.
- » Fraseri.

Très belle esp. à fl. jaune vif, à tige rougeatre et fleurissant de juillet en octobre.

» fruticosa major.

Onothera macrocarpa.

Pl. basse et traînante, à très grandes fl. jaunes fleurissant 4 ou 5 mois durant.

- » nivea.
- » pumila.
- » speciosa.

Belle pl. vivace à grandes fl. rose clair.

- » spiralis.
- » taraxacifolia.

Toutes les Onothères sont de cult. extrêmement facile.

Opuntia rustiques.

Voir Cactées rustiques.

Orobus niger. Pl. solide pour garnir les sous bois.

- » superbus.
- » tuberosus.

Pæonia albiflora à fl. blanc pur, simples.

- » anomala.
- » arietina.
- » coralina.
- decora (romanica).
- » Emodi.
- » lobata.
- » microcarpa.
- » officinalis.
- » paradoxa.
- » peregrina.
- » pubens.
- » tenuifolia.
- » triternata.

Les Pivoines types sont de très belles pl. d'ornement. Leurs gr. germent toujours mais seulement au bout d'une année.

Pancratium maritimum.

Papaver involucratum.

Enorme fl. d'un rouge éclatant.

- » hybridum.
- » lateritium.
- » maximum.

Très belles fl. mesurant plus de 30 cent. de diamètre; pétales d'un rouge sang très ardent; la plus décorative et la plus richement colorée des pl. vivaces.

» Orientale

Très gros pavot rouge, pl. à grand effet; de culture extrêmement facile; leve bien de graines.

- » var. hybrida.
- » Royat Scarlet.
- » » Salmon Queen.
- » » brillant.
- » » Blush Queen.
- » nudicaule (Pavot d'Islande).
- var. à fl. blanche, jaune, soufre, rouge, orange, etc., à fl. striées, à fl. simples ou doubles, séparées ou en mélange.

Le Pavot d'Islande est peut-être la meilleure des pl. vivaces, car la fl. en est gracieuse et très apparente et se conserve longtemps dans l'eau; en outre la plante fleurit pendant une bonne partie de l'année, à l'ombre ou au soleil. Elle préfère les sols légers et pierreux aux sols argileux mais va partout assez bien. Elle s'élève avec facilité par semis.

Papaver splendidissimum.

Très belle espèce à grandes fl. rouges.

» somniferum.

Pardanthus sinensis.

Pentstemon acuminatus. » atropurpureus.

- » campanulatus.
- » carinatus.
- » Carmanus.
- » centrantifolius.
- » cobœa.
- » cœruleus.
- » confertus.
- » cordifolius.
- » cyananthus.
- » diffusus.
- » digitalis.
- » Eatoni.
- » glaber. » » à fl. rouges.

Pentstemon heterophyllus.

- » humilis.
- » Jeffrayanus.

C'est une excellente pl. à floraison très prolongée, bonne pour bouquets.

- » lævigatus.
- » Mackayanus.

Espèce très florifère.

- » ovatus.
- » perfoliatus.
- » procerus.
- » pubescens.

Fl. très nombreuses, de teinte opale, se succédant tout l'été.

- » puniceus.
- » Richardsonni.
- » rubricaulis.
- » secundiflorus.

Les Pentstemon sont de bonnes pl. vivaces de platesbandes ou de rochers, qui fleurissent longtemps et sont très ornementales. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; leurs fl. sont d'entre les meilleures pour les bouquets.

Phlomis Samia.

Belle plante d'ornement à fl. jaune clair et orange.

- » fruticosa.
- » tuberosa.

Phlox decussata.

» divaricata.

Phygelius capensis.

Physalis Alkekengi (Coqueret).

Excellente pl. à gros fruits baciformes et entourés d'une belle vésicule rouge brique vif, qu'on conserve pour les bouquets d'hiver.

» Franchetti.

Beaucoup plus grande et décorative que la précédente.

Physotegia speciosa alba.

» virginica.

Très belle pl. vivace à fl. lilas rose.

» var. alba.

Phytolacca dioica.

» decandra.

Platycodon autumnale.

- » grandiflorum.
 - » à fl. blanches.
 - » nanum.
- » Mariesi.
- » Mariesi major.
- » » à fl. blanches.

Superbes Campanules à grandes fl. ornementales, fleurissant de juillet en automne, de culture facile et excellentes pour bouquets.

Polemonium cœruleum.

- » » bipinnatifidum.
- » à fl. blanches.
- » gracile.
- » dissectum.
- » foliosissimum.
- » grandiflorum.

Les Pol. sont des pl. robustes et très florifères, des plus faciles à élever et à cult.; fl. nombr. odorantes et précieuses pour bouquets.

Polygonum amplexicaule.

- » cuspidatum.
- » molle.

Polygonnm orientale.

Pl. annuelle de grandes dimensions et à beaux épis d'un rose vif.

» sphærostachium.

Potentilla atropurpurea.

A fl. d'un rouge très foncé; belle pl. très florifère; culture facile.

- » chrysantha.
- » Formosa, rose chair.
- » Hortensis.

Les meilleures variétés horticoles.

- » Mac Nabiana.
- » Nepalensis, à fl. rose vif.
- » pulcherrima.

Primula acaulis à fl. bleues.

» Auricula vars.

Les meilleures Auricules des jardins anglais.

» Japonica

Excell. pl. très fl. et propre à garnir les lieux frais.

- » obconica (non rustique).
- » Poissoni.
- » polyantha (Hort.).

Dans les meilleures var. anglaises.

- » rosea.
- » » v. grandiflora.
- » veris.

Pycnanthemum lanceolatum.

» pilosum.

Pl. aromatiques.

Pyrethrum macrophyllum.

» roseum.

Ranunculus asiaticus.

Rhazia orientalis.

Rheum Collinianum.

- Emodi.
- » officinale.
- » palmatum.
- » » var. à fl. rouges.
- » var. purpureum.
- » var. Tanguticum.

Rhaponticum cynarioides.

Rodhea japonica.

Rosmarinus officinalis (Romarin).

Rudbeckia californica.

- fulgida.
- » hirta.
- » laciniata.
- » pinnata.
- » purpurea.

Très belle esp. à fl. rouge foncé, fleurissant de juillet en octobre-novembre; fl. excellentes pour les bouquets.

- » purpurea nana.
- » speciosa.
- » triloba.

Ce sont d'excellentes pl. viv., solides, très fl. et dont les capit. jaune avec centre noir ou rouge foncé font le plus grand effet. Très bonnes pour la fl. coupée et de longue conserv. dans l'eau.

Salpichroma rhomboidea.

Salvia argentea.

Belles feuill. velues, soyeuses; fl. blanc azuré.

» azurea.

Belle fl. d'un azur très pur.

- » azurea var. grandiflora.
- » japonica.

Salvia mellifera.

- » Sclarea officinalis.
- » ringens (aromatique).

Superbe sauge grecque aux grandes fl. d'azur.

» verbenacea.

Sanguisorba canadensis.

» dodecandra.

Santolina Cyparrissus.

- » pinnata.
- » rosmarinifolia.

Saponaria officinalis.

Scilla autumnalis.

- » campanulata.
- · cernua.
- » japonica.
- » Lusitanica.
- » nutans.
- » obtusifolia.
- » patula.
- » pratensis.
- » sibirica.

Scutellaria altissima.

- » alpina var alba.
- » californica.
- » macrantha.
- » orientalis.

Silene Armeria.

Silphium doronicæfolium.

- » lanceolatum.
- » perfoliatum.
- » Terebinthinum.

Sisyrichium anceps.

- » bellum.
- » Bermudianum.
- » iridifolium.

Solanum dulcamara.

Solenanthus apenninus.

Solidago canadensis,

- » rigida.
- » spectabilis.

Spiræa aruncus (Reine des bois).

» lobata.

Stachys coccinea.

Stanleya pinnata.

Statice bellidifolia.

- » coronata.
- latifolia.

Excellente pl. viv. à larges panic. de fl. bleues qu'on peut conserver pour l'hiver; fl. à bouquets de premier ordre.

- » Sareptana.
- » Serbica.

Symphitum asperrimum.

» tauricum.

Tanacetum macrophyllum.

Pl. à grandes formes; énormes capit. de fl. blanches.

» vulgare.

Telekia speciosa.

Le Telekia est l'une des plus solides et des plus précieuses pl. viv. d'ornement; grand feuillage architect. et beaux capitules d'or, fortement aromatiques.

Thermopsis caroliniana.

- Fabacea.
- lanceolata.

Thermopsis montana.

» rhombifolia.

Tournefortia elegans.

Heliotropioides.

Trachelium cœruleum.

Triosteum pinnatifidum.

Tropæolum pentaphyllum.

(La capucine vivace.)

» peregrinum.

Trycirtis hirta.

Tulipa Celsiana. » Didieri.

- » fulgens.
- » Greigii.
- » Kolpakowskyana.
- » Marjoletti.
- » montana.
- » præcox.
- » sylvestris.
- » Turkestanica.
- » viridiflora.
- " VIIIIIIIIIII
- » sp. Chitral (Himalaya).
- » sp. Hazara (Himalaya).

Uniola latifolia.

Jolie graminée ornement.

Verbascum Blattaria.

- » Cedreti.
- » Hænkii.

Molène à fl. rougeatres.

- » Lychnitis,
- » malachotrychum.
- » malachophyllum.
- » Olympicum.
- Pl. décorative.

Verbascum Olympicum. à fl. blanches.

- » Phlomoides.
- » phœniceum.
- » vars.

Charmantes Molènes à fl. violet foncé, blanches ou roses très florif.

- » pulveralentum.
- » rigidum.
- » simplex.
- » Thapsus.
- » var. à fl. blanches.

Verbena officinalis.

» venosa.

Jolie verveine vivace et rustique.

Vernonia altissima.

- » arkansana.
- » corymbosa.
- » novæboracensis.

Compos. à grandes panic. de fl. violet foncé.

Veronica carnea.

- » crassifolia.
- » dentata.
- » exaltata.
- » Gentianoides.
- » grandis.
- » incisa.
- » longifolia.
- » maritima.
- » subsessilifolia.

Brillante espèce à floraison prolongée.

Veronica virginica.

Ces véroniques sont de bonnes et solides pl. viv., aux fl. nombr. et durables, bleu plus ou moins foncé ou roses, disposées en longs épis; très recherchées des abeilles.

Vincetoxicum nigrum.

- » officinale.
- » rubrum.
- » sibiricum.

Viola cornuta.

(Pensée bleue viv. des Pyrénées.)

- » cornuta à fl. blanch.
- » » à fl. jaunes.

Viscaria oculata.

Zauschneria californica.

Très belle pl. à fl. vermillon.

Zephyranthes candida.

Graines d'arbres, d'arbustes et de plantes grimpantes, récoltées dans les zones froides ou tempérées des cinq continents¹.

Les arbustes et arbres s'élèvent facilement au moyen du semis. Nous offrons ici une collection très importante de la plupart des espèces cultivables chez nous.

Abies balsamea.

- » canadensis.
- » concolor.
- » magnifica.
- nigra.
- » pungens.
- » sibirica.
- » sitchensis.
- » subalpina cœrulescens.
- » » glauca.

Charmants sapins à feuill. argenté bleuâtre, très propres à donner la note gaie et artistique dans un parc ou jardin.

» taxifolia.

Acer Ginale.

- » glabrum.
- » rugosum.
- » saccharinum (Erable à sucre.)
- » spicatum.
- » tataricum.

Akebia quinata.

Albizzia (Acacia) julibrissin.

Joli mimosa, à fl. roses, rustique chez nous.

Alnus glutinosa.

- » incana.
- » var. virescens.
- » japonica.
- » oregana.
- » quercifolia.
- » rubronerva.
- » sibirica.
- » subcordata.
- » sp. Japon.

Amelanchier alnifolia.

» canadensis.

Amelanchier Utahensis.

» vulgaris.

Amorpha fruticosa.

» nana.

Ampelopsis aconitifolia.

- » quinquefolia (vigne vierge).
- » Veitchii.

(Petite vigne vierge japonaise.)

Amygdalus nana.

Andromeda calyculata.

- » polifolia.
- » speciosa.

Anona triloba.

Arbutus Unedo.

Arctostaphylos alpina.

- » glauca.
- » pungens.
- » tomentosa.
- » Uva Ursi.

Ardisia japonica.

Aristotelia Maqui.

Aronia (Amélanchier) melanocarpa.

Feuillage rougissant à l'automne.

Ascyrum Crux-Andræ.

» stans.

Petits arbustes américains voisins de Hypéricums.

Aucuba japonica.

Baccharis halimifolia.

Berberis aristata.

- » Darwini.
- » integerrima.
- » repens.
- » sibirica.
- » Sieboldi.
- » stenophylla.

¹ Beaucoup de ces espèces sont rares ou nouvellement introduites.

Berberis Thunbergiana.

- » virescens.
- » vulgaris.

Betula alpestris.

- » carpathica.
- » Ermanni.
- » excelsa.
- » glandulosa.
- » humilis.
- » hybrida.
- » lenta.
- » lutea.
- » microphylla.
- » nana.
- » occidentalis.
- » odorata.
- » papyracea.
- » pubescens.
- » pumila.
- » ulmifolia.

Bignonia capreolata.

- » grandiflora.
- » radicans.

Précieuses pl. grimpantes de l'Amérique du Nord.

Budleya intermedia.

- » japonica.
- » Lindleyana.
- » variabilis.

Bumelia tenax.

Bupleurum fruticosum.

Buxus sempervirens.

Callicarpa americana.

- » japonica.
- » purpurea.

Calophaca Wolgarica.

Calycanthus præcox.

Caragana altagana.

» microphylla.

Carpinus americana.

- » Betula.
- » caroliniana.
- » carpinus.
- » cordata.
- » Jedænsis.
- » orientalis.

Carya alba.

Caryopteris mastacanthus.

» à fl. blanches.

Cassia Marylandica.

Ceanothus americanus.

- » divaricatus.
- » integerrimus.

Ceanothus Parryi.

- » Sorediatus.
- * thyrsiflorus.
- velutinus.

Celastrus articulatus.

Celtis occidentalis.

- » australis.
- » caucasica.

Cephalanthus occidentalis.

Cephalotaxus drupacea.

Cerasus illicifolius.

Cercidiphyllum japonicum.

Cercis canadensis.

- » siliquastrum (arbre de Judée).
- » » à fl. blanches.

Cercocarpus intricatus.

» parvifolius.

Chamæcyparis pilifera.

Chimonanthus fragrans.

Chionanthus virginica.

Cistus albidus.

- » ladaniferus.
- » lauritolius.
- » monspeliensis.
- » salvifolius.
- » villosus.

Les Cistes sont de charmants arbrisseaux méditerranéens qui se couvrent de fleurs d'églantines roses, carmin ou blanches et produisent un grand effet. Tous ne sont pas absolument rustiques sous le climat de Genève ou Paris, mais ils le sont dans l'Ouest et en Angleterre.

Citrus triptera.

(Citronier rustique, du Japon.)

Clematis apiifolia.

- » æthusifolia.
- » coccinea.
- » cylindrica.
- » Douglasi.
- » flammula.
- » Fremonti.
- » fusca.
- » glauca.
- » graveolens.

Très curieuse Clématite grimpante portant des milliers de fleurs jaunes pendant tout l'été.

- » ligustifolia.
- » montana.
- » paniculata.
- » Pitcheri.
- » recta.
- » Soongarie.
- » Stans.
- » tubulosa.
- » verticillaris.
- » virginiana.
- » Viticella.

L'ancienne petite Clématite violette.

» Vitalba.

C'est la Clématite sauvage des bois et des haies; elle fait admirablement dans nos jardins et se recommande comme pl. grimpante de grande valeur à cause de sa rusticité à toute épreuve, de sa croissance rapide qui égale presque celle de la Glycine et aussi par ses fleurs et ses graines qui sont hautement décoratives.

Clerodendron trychotomum:

Clethra alnifolia.

» canescens.

Colutea arborescens.

» cruenta.

Corchorus capsularis.

Coriaria japonica.

» myrtifolia.

Cornus alternifolius.

- » canadensis.
- » florida.
- » macrophylla.
- » Nuttalli.

Cornus paniculata.

" sericea.

" suecica.

Coronilla Emerus.

" Emeroides.

" glauca.

Corylus americana. Cotoneaster acutifolia. Administrational acutifolia.

baccillaris.

buxifolia.

» Davidiana (horizontalis).

C'est le meilleur des arbustes de rocailles; ses branches s'étalent sur le sol en larges ragettes ou palmettes garnies de jolies feuilles luisantes et se couvrent littéralement de fl. roses, puis de baies rouge vif qui persistent l'hiver. La graine lève facilement.

Franchetti.

japonica.

microphylla.

nigra.

pannosa.

Excellent arbuste, gracieux et gai, introduit dernièrement du Yun-Nan.

Simonsii.

tomentosa.

thymifolia.

A très petit feuillage persistant, vert foncé luisant.

vulgaris.

Cratægus aprica.

argentea.

arkansana.

Arnoldiana.

azerollana.

coccinea.

coccinoides.

crus galli.

Douglasi.

Cratægus glandulosa.

melanocarpa. >>

mollis.

nitida.

oxyacantha.

à fruits jaunes.))

rivularis.

tomentosa.

uniflora.

» viridis.

Cunninghamia sinensis. Cupressus Arizonica.

» macrocarpa.

thuyoides.

Cyrilla racemiflora. Cytisus albus.

alpinus.

austriacus.

capitatus. Excellent arbrisseau de 1 à 1 m. 1/2 qui sé recouvre de fl. jaunes pendant une bonne partie de l'année.

elegantus.

elongatus.

Friwaldskyanus.

hirsutus.

Laburnum.

monspessulanus.

nigricans.

Cytisus purpureus.

radiatus.

sessilifolius.

Uralensis.

Daphne alpina.

» Laureola.

Mezereum.

striata.

Daphniphyllum macropodium. Desmodium japonicum.

» laburnifolium.

penduliflorum.

Deutzia gracilis.

Diervillia japonica. Diospyros Lotus.

» Virginiana.

Dirca palustris.

Dorycnium suffruticosum.

Empetrum nigrum. Ephedra altissima.

distachya.

fragilis.

Monostachia.

nevadensis.

viridis.

Eurya japonica.

Euscaphys staphyloides.

Evonymus alatus.

atropurpureus.

europæus.

v. Japon.))

filiformis.

Hamiltonianus.

japonicus, v. radicans.

latifolius.

oxyphillus.

Exochorda Alberti.

» grandiflora.

Fagus americana.

Forsithia suspensa.

Fatsia japonica.

Fraxinus americana.

» Oregana.

Ornus.

platycarpa.

pubescens.

quadrangulata.

velutina.

» viridis.

Fremontia californica.

Fumana glutinosa.

» lœvipes.

Garrya ellyptica. Genista ætnensis.

» Andreana.

» anglica.

austriaca.

ferox.

germanica.

hispanica.

juncea,

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

Lobelii.

Genista pilosa.

- » radiata.
- » sagittalis.
- » scorpius.
- » sibirica.
- ». tinctoria.
- » virgata.

Tous ces Genéts sont excellents pour garnir les rocailles, au soleil. Floraison prolongée, pl. solides.

Gleditschia japonica.

Glycirrhyza glabra (Réglisse).

Gymnocladus canadensis.

Halesia corymbosa.

- » diptera.
- » hispida.
- tetraptera.

Halimodendron argenteum.

Hamamelis virginica.

Hedera chrysocarpa (lierre à fr. jaunes).

» colchica.

Hedysarum multijugum.

C'est l'un des meilleurs arbrisseaux d'ornement. Fl. carmin vif, très abondantes et se succédant tout l'été sur la pl. jusqu'aux froids.

Heimia (Neillia) myrtifolia.

salicifolia.

Hippophaërhamnoides (Argousier).

» salicifolia.

Hovenia dulcis.

Hydrangea arborescens.

Hortensia v. acuminata.

- » paniculatum.
- » radiata.
- » scandens.

Hypericum Androsæmum.

» aureum. Floraison abondante.

» densiflorum.

Jolie et rare pl. au port élégant.

- » galioides. Idem.
- » hircinum.
- » Hookerianum.
- » Kalmianum.
- » patulum.
- » poliphyllum.
- » prolificum.

Charmants millepertuis, américains pour la plupart, formant de légers arbustes aux innombrables fleurs jaunes.

Idesia polycarpa.

» maranesi.

Ilex aquifolia (Houx).

- » decidua.
- » integra.
- * monticola.
- » opaca.
- » Perado.
- verticillata.

Indigofera decora.

- » dosua.
- tinctoria.

Isomeris arborea.

Itea virginica.

Jamesia americana.

Jasminum fruticans.

» officinale grandiflorum.

Juglans nigra.

Juniperus communis.

- » filiformis.
- » macrocarpa.
- » monosperma.
- » nana (Genevrier traînant des Alpes).
- » occidentalis.
- » phœnicea.
- » procera.
- prostata.
- » rigida.
- » Sabina (La Sabine des Alpes).

Juniperus Virginiana.

Kalmia angustifolia.

» latifolia.

Kennedia rubicunda.

Kerrya japonica.

Kohlreuteria paniculata.

Lagerstræmia indica.

Larix dahurica.

- » europæa (Mélèze).
- » leptolepis.
- » sibirica.

Laurus Benzoin,

- » caroliniensis.
- » nobilis.
- » Sassafras.

Ledum grænlandicum.

- » latifolium.
- » palustre.

Leicesteria formosa.

Leiophyllum prostratum.

» buxifolium.

Lespedeza bicolor.

- » Buergeri,
- » striata.

Leucothoë Catesbæi.

» racemosa.

Libocedrus chilensis.

Ligustrina amurensis.

Liqustrum Ibota.

japonica.

Lindera (Laurus) Benzoin.

- » glauca.
- » hypoleuca.

Liquidambar styraciflora.

Lonicera alpigena. (Chèvrefeuille des Alpes.)

- » canescens.
- » chrysantha (Ch. f. doré).
- » cœrulea (Ch. f. alpin à fruits bleus).
- » flava.
- » fragrantissima.
- » involucrata.
- » japonica.
- » » var.
- » Maacki.
- » Morrowi.
- » nigra (Chèvrefeuille des Alpes à fruits noirs).
- » pyrenaica.
- v rupicola.
- » Ruprechtiana.
- » translucens.
- » Xylosteum.

Lycium barbarum.

Lycium chinense inerme.

» » spinosum.

» obovatum.

Maclura aurantiaca. Magnolia acuminata.

- » Fraseri.
- » glauca.
- » grandiflora.
- » hypoleuca.
- » Kobus.
- » macrophylla.
- » rotundifolia.
- » tripetala.
- » umbrella.

Ces espèces sont rustiques.

Mallotus japonicus.

Margyricarpus setosus.

Melia azedarach.

» japonicus.

Menispermum canadense.

Myrica cerifera. (L'arbre à cire.)

- » californica.
- » caroliniana.
- » gale.

Myricaria germanica.

» dahurica.

Nerium Oleander.

Nuttalia cerasiformis.

Nyssa aquatica.

- » capitata.
- » multiflora.
- uniflora.

Olearia Haastii.

» macrodontha.

Ononis fruticosa.

- » Natrix.
- » rotundifolia.

Orixa (Celastrus) japonica.

Ostrya virginica.

Osyris alba.

Pachystigma Myrsinites.

Paliurus aculeatus.

» australis.

Jolis arbust. épineux, à forme gracieuse et propres à former des haies.

Parthenocissus Vitacea.

Pavia macrostachya.

Passiflora cœrulea.

» lutea.

Peraphyllum ramosissimum.

Periplocea græca (pl. grimpante).

Persica violacea (Pêche sanguine).

Petalostemon candidus.

* » tenufolius.

Philadelphus grandiflorus.

» gordonianus.

Photinia arbutifolia.

» glabra.

Phylliræa augustifolia.

- » latifolia.
- » media.

Phyllodoce cœrulea

» taxifolia.

Picea Engelmanni glauca,

Picea nigra. Sapin noir d'Amérique.

- » obovata.
- » orientalis.
- » pungens (P. Parrayana glauca).

C'est l'une des plus brillantes introductions de ces dernières années, une conifère au feuillage glauque et presque bleu, qui fait un contraste charmant dans le jardin ou le parc.

» subalpina. Joli sapin des Cordillères américaines.

Pinckneya pubens. Gracieux petit arbuste amér. Pinus austriaca.

- » Balfouriana.
- » Banksiana.
- » Benthamiana.
- » Cembro (Pin d'arole).
- » Coulteri
- » densiflora.
- » edulis.
- » flexilis.
- » Fremontiana
- » Halepensis.
- » inops.
- » insignis.
- » Ieffrayi.
- » Lambertiana.
- » mitis.
- » monophylla.
- » montana
- » monticola.
- » muricata.
- » Murrayana.
- » palustris (Pitchpin)
- » Parryana.
- » Pinea.
- » ponderosa.
- » resinosa.
- » rigida.
- » Sabiniana.
- » tæda.
- » Thunbergi.
- » Torreyana.
- » tuberculata.
- uliginosa.
- » uncinata.

Pittosporum Tobira. Platycaria japonica.

» strobilacea.

Potentilla fruticosa. Prunus Lainocerams.

- » maritima.
- » pendula.
- » serotina.
- » Sieboldi.

» virginiana. Pseudo-tsuga Douglasi glauca.

Pterocarya caucasica.

Pueraria Thunbergi.

Punica Granatum.

- Pyrus arbutifolia.

 » baccata.
 - » lanata
 - » lanuginosa.
 - » Malus.

Pyrus nigra.

- pensylvanica.
- rivularis.
- sambucifolia.
- Toringo.

Raphiolepis japonica. Rhamnus caroliniana.

- californica.
- dahuricus.
- Frangula.
- japonica,
- Libanotica.
- Pallasi.
- pumila.
- Purshiana.

Rhodocistus Bertoletianus. Rhododendron caucasicum.

- Chamæscistus.
- ferrugineum.
- hirsutum.
- Kamtschaticum.

Rhus aromatica.

- copallina.))
- Coriaria. Э
- glabra, Э
- Laurina.))
- radicans.))
- semi-alata.
- sylvestris.
- succedanea..
- Toxicodendron.
- trilobata.
- typhina.
- venerata. A supplied by the supplied by the

Les Rhus sont de jolis arbustes dont les feuilles rougissent à l'automne.

Ribes alpina.

- cereum.
- diacantha.
- Grossularia.
- rotundifolia.
- sanguinea.

Robinia Neo-Mexicana.

Rosa alpina.

(La superbe Eglantine pourpre des Alpes, sans épines.)

- Arkansana.
- Banksiæ.
- blanda.
- Carolinæ.
- coriifolia.
- Fendleri.
- Fortunei.
- gymnocarpa.
- lucida.
- microcarpa.
- microphylla.
- moschata.
- multiflora.
- Nutkana.
- pimpinellifolia.
- pomifera.
- rubiginosa.
- rubifolia.
- rugosa.

Rosa rugosa à fl. blanches.

- sempevirens.
- setigera.
-)) trachiphylla v. Jundzilla.
- venosa.
- Woodsii.
- sp. nov. du Colorado.

Rubus biflorus.

- deliciosus.
- fraxinifolius.
- laciniatus.
- Nutkanus.
- odoratus.
- Xanthocarpus.

Ruscus aculeatus (Buis ardent).

- » Hypophyllum.
- racemosus.

Ruta graveolens.

Sambucus australis.

- callicarpa.
- canadensis.
- Ebulus.
- glauca.
- pubens.
- pubescens.
- racemosa.
- Sieboldiana.

Santolines (voir pl. vivaces).

Sapindus marginatus.

- Mukorowi.
- utilis.

Sarothamnus scoparius.

Schinus dentata.

- » montana.
- patagonica. Sciadopytis verticillata.

Schizophragma hydrangeoides.

Shepherdia canadensis.

Skimmia japonica.

Smilax aspera.

- hispida.
- laurifolia.
- mauritanica.
- Oldhami.
- excelsa.
- rotundifolia.
- tamnoides.
- Walteri.

Ce sont de délicieux arbustes grimpants nommés aussi Salsepareille, aux feuilles d'un vert gai et luisant, persistant et l'une des plus belles décorations en hiver.

Sophora flavescens.

» japonica.

Sorbus Aria.

- americana.
- aucuparia.
- var. dulcis.
- chamæmespilus.
- domestica.
- scandica.

Spartium junceum.

Le Genêt jaune du Midi; excellent pour la décoration des jardins, des grands rochers, des pentes arides et des lieux secs. Lève facilement et croit très vite.

Spiræa opulifolia.

- » salicifolia.
- » tomentosa.

Stephananda Tanakæ. Staphylea Bumalda.

- colchica.
- trifoliata.

Sterculia platanifolia.

Stuartia pentagyna.

Suæda altissima.

» glauca.

Symphoricarpus occidentalis.

» racemosus.

Tilia americana.

» platiphylla.

Torreya californica.

» nucifera.

Trachelospermum jasminoides

Tsuga caroliniana.

Ulex europæus (ajonc).

» nanus.

Umbellularia californica.

Vaccinium corymbosum.

- Myrtillus (Myrtille).
- pennsylvanicum.
- uliginosum (Airelle bleue).
- Vitis Idæa (Airelle rouge).

(espèces ligneuses, voir gr. de la Nouvelle-Zélande).

Viburnum acerifolium.

- cotinifolium.
- dentatum.
 - dilatatum.
- Opulus.
- tomentosa.

Vitex agnus Casti.

- » incisa.
- negundo.

Vitis californica.

- » cordifolia.
- orientalis.

Widdringtonia Whitei. Wistaria frutescens.

- magnifica.
- sinensis.

Xanthoceras sorbifolia. Xanthoxylum ailanthoides.

- alatum.
- inerme.
- piperitum.
- planispinum.
- schinifolium.

Graines de plantes vivaces ou montagnar des, récoltées dans l'Amérique du Nord (Montagnes Rocheuses, Colorado, etc.)

Abronia fragans.

» micrantha.

Actinella grandiflora.

» scaposa.

Ambrosia trifida

(pour garnir lieux stériles).

Anemone dichotoma.

- » Hudsoniana.
- multifida.
- occidentalis.
- patens, forme américaine.

Aplopappus Fremonti.

Aquilegia arctica.

» cœrulea.

La plus belle des Ancolies; graines récoltées dans les Montagnes Rocheuses.

» truncata (rouge et jaune).

Argemone hispida.

» platyceras.

Arnica cordifolia.

- » alpina.
- latifolia.
- longifolia.

Artemisia canadensis.

- » arbuscula.
- filifolia.
- » frigida.

Asclepias speciosa.

Ascyrum crux-andræ.

» stans.

Aster acuminatus.

- amethystinus.
- canescens.
- Chapmanni.
- commutatus.
- corymbosus. Curtisii.
- Fendleri.
- Fremonti.
- lævis.
- nanus.
- novæ angliæ.
- Porteri.
- sp. Montagnes Rocheuses.
- simplex.
- tanacetifolius.

Aster turbinellus. Astragalus caryocarpus.

Drummondi.

pictus.

racemosus.

shortianus.

Atriplex confertifolia.

» canescens.

Baptisia exaltata.

leucantha.

Bigelovia graveolens.

» Howardi.

Boisduvalia densiflora.

Boikinia aconitifolia.

» rotundifolia.

Brickelia grandiflora. Brodiæa congesta.

Cacalia tuberosa.

Calandrinia umbellata.

Callirhœ pedata.

» involucrata.

verticillata.

Callocorthus sp.

Camassia esculenta.

» Fraseri.

Castilleia integra.

pallida.

sessiliflora.

Centromedia pungens. Chelone barbata.

coccinea.

Torreyi.

Excellentes pl. vivaces à fl. rouge vif.

Chilopsis saligna.

Chlorogalum pomeridianum.

Chrysopsis Rutteri.

villosa.

Cimicifuga racemosa. Clematis Douglasi.

coccinea.

cylindrica.

Fremontii.

indivisa.

ligusticifolia.

verticillaris.

Virginiana.

Collinsia sparsiflora.

» Torreyi.

Convolvulus luteolus.

purpureus.

Coreopsis senifolia.

tripteris.

trichosperma.

Corylus americana (Noisetier américain):

Cosmanthus rigidus.

Cucurbita perennis (Courge viv.).

Delphinium azureum. D'un bleu superbe.

bicolor.

californica.

nudicaule (rouge écarlate).

occidentale.

Parryi.

scapulorum.

Diclytra eximia.

Dipplostephium salicifolium.

Dodecatheon pauciflorum.

Echinocystis lobata. Ephedra viridis.

Erigeron cæspitosus.

compositus.

Coulteri.

flagellaris.

glaucus.

Hartwegi.

salsuginosus.

Eriogonum campanulatum.

flavum.

giganteum.

mariifolium.

umbellatum.

Eriophyllum cæspitosum.

» confertifolium.

Escholtzia aurantiaca.

» Austinæ.

californica.

croceum.

v. à fl. blanches.))

glauca.

Eupatorium perfoliatum.

» maculatum.

Euphorbia robusta.

Frasera speciosa.

» tubulosa.

Gentiana Bigelowi.

» alba.

Andrewsi.

» Parryi.

Geranium Fremonti.

Geum Rossii humile.

Gilia aggregata.

» Chamisonnis.

» pungens.

Gillenia stipulacea.

» trifoliata.

Grindelia glandulosa.

» inuloides.

Excellentes plantes vivaces, fleurs jaunes, bonnes pour les bouquets.

Gutierrezia Euthamiæ.

Helenium Bigelowi.

Helianthus Maximilianus.

pumilus.

strumosus.

Heliopsis scabra. Heracleum lanatum.

Hunemannia fumariæfolia.

Hypericum Ascyron.

aureum.

Galioides.

prolificum.

scouleri.

Ipomœa leptophylla. Superbe liseron vivace à gros tubercule.

Pandurata, idem.

Ivesia santolinoides.

Krigia dendelion, var. montana.

Lepachrys columnaris.

» pulcherrima.

Leptosyne Bigelowi.

Douglasi.

gigantea.

maritima.

Liatris elegans

Liatris elegans.

» punctata.

» scariosa.

» formeprécoce.

spictata.

Les Liatris sont d'excellentes pl. vivaces à fl. roses ou carmin, en épis dresés, belles et originales.

Lilium Gravi.

» superbum.

Lithospermum angustifolium.
Lithospermum longiflorum.

» multiflorum.

Malvastrum coccineum.

Davidsonni.

Mertensia ciliata.

» lanceolata.

Modiola multifida. Monarda dydima.

» kalmiana.

Bonnes et belles pl. vivaces ornementales et florifères.

Enothera albicaulis.

arguta.

brachycarpa.

cæspitosa.

Fraseri.

nivea.

ovata.

ovata.
serrulata.
speciora.

))

taraxacifolia.

Onosmidium carolinianum.

Opulaster Torreyi.

Oxycoccos macrocarpa.

Oxytropis deflexa.

» Lamberti.

spicata.

Parthenocissus Vitacea. Pentstemon acuminatus.

albus.

campanulatus.

cobæa.

cordifolius.

cœruleus.

confertus.

cyananthus.

glaber.

» var. albiflorus.

glacilis.

Hartwegi.

humilis.

Mackayanus.

rubricaulis.

stenopetalus.

virgatus.

Les Pentstemon sont extrêmement précieux pour la décoration des jardins et pour la fl. coupée. Ce sont des pl. vivaces de grande valeur et de culture extrêmePetalostemon candidus.

» tenuifolius.

Phacelia californica.

» glandulosa.

sericea.

» tanacetifolia.

Phlox acuminatus.

» divaricata.

» Douglasi.

» paniculata.» pilosa.

Physaria dydimocarpa. Physostegia virginica.

» » alta. Polemonium foliosissimum.

» melitum.

» Richardsoni.

Polygonatum giganteum. Potentilla arachnoides.

» glandulosa.

Hippiana.

pulcherrima.

pennsylvanica.

Rivalis millegramma.

Primula Parryi.

Psiloria californica.

Psoralea macrostachya.

» monticola.

Pyrus rivularis.

Ranunculus cardiophyllus.

Romanzoffia Sitchensis.

Rosa Arkansana.

» Fendleri.
» lucida.

Rubus Nutkanus.
Ruellia ciliosa.
Rumex venosus.
Sabbatia campestris.
Salvia agurea grandiflora.
(L'une des plus belles floure blouse) (L'une des plus belles fleurs bleues.)

» spathacea.

Sanicula Marilandica. Sarracenia flava.

» purpurea.» variolaris.Senecio Douglasi.

Silene pennsylvanica.

Smilax herbacea.

Solidago Riddeli.

» rigida.

Stanleya pinnata.

Stuartia pentagyna.

Tedradymia canescens.

Thalictrum Cornuti.

» Fendleri.

Thermopsis montana.

» rhombifolia.

Tiarella cordifolia.

Towsendia grandiflora. Tradescantia virginica.

Trillium cernuum.

» pendulum.» sessile.

Veratrum californicum.

Viola alsophylla.

cognata.

delphinifolium.

Nuttalli.

pedatifida.

Viola primulæfolia. Xerophyllum tenax. Yucca angustifolia. Zauschneria californica.

Graines reçues de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie.

Acacia alata.

juniperifolia.

leprosa.

longifolia var. Sophoræ.

pycnantha.

verticillata.

Callistemon coccineus.

» lanceolatus.

linearis.

phœniceus.

rigidus.

speciosus. Callitris Gunnii.

Carmichælia australis.

compacta.

erecta.

Cassinia fulvida. Casuarina distyla.

equisetifolia.

quadrivalvis.

Celmisia spectabilis. Clianthus puniceus.

Colobanthus acicularis.

Coprosma linarifolia.

lucida.

propingua.

Cordyline australis. Corokia cotoneaster.

Dodonæa triquetra.

Doryanthes Palmeri.

Entelea arborescens.

Epilobium brevipes.

erubescens.

glabellum.

Linnæoides.

melanocaulon.

var.

microphyllum.

nummulariæfolium.

pedunculare.

pubens.

sp. Nouvelle-Zélande.

Erpetion reniforme.

Eucalyptus amygdalina.

calophylla.

capitellata.

Eucalyptus coriacea.

cornuta.

crebra.

drepanophylla.

Eugenioides.

fœcunda.

globulus.

goniocalyx.

Gunnii.

leucoxylon.

macrandra.

obliqua.

paniculata.

platypus.

resinifera.

robusta.

rostrata.

tereticornis.

Gaultheria antipoda.

Geranium sessiliflorum.

Grevillea robusta.

Haloragis micrantha.

Hardenbergia monophylla.

» bimaculata.

Hymenosperum flavum. Lagenophora petiolata.

Melaleuca diosmæfolia.

» Preissiana.

Mimulus primuloides.

Muehlenbeckia adpressa.

» complexa.

Pernetia Neo Zelandica.

Pimelea, sp. à odeur de Daphne.

Pittosporum bicolor.

crassifolium.

Ervocarpum.

Eryoloma.

Phylliræoides.

Ralphii.

rigidum.

tenuifolium.

Plagianthus pulchellus.

undulatum.

Pratia angulata.

Samolus repens.

Selliera radicans.

Senecio elœagnoides.

Sollya heterophylla. Sophora tetraptera. Sterculia diversifolia.

acerifolia.

Swainsonia galegifolia. Tristania conferta.

» Laurina

Veronica amplexicaulis.

- » Andersoniana.
- Bidwilli.
- buxifolia.
- Cataractee.

Veronica glauca-cœrulea.

- Kirkii.
- Lyalli.
- monticola.
- parviflora.
- pinguæfolia.
- pseudo traversi.
- salicifolia.
- Thymifolia.
- Traversi.

Vittadenia australis. Widdringtonia Whitei.

Graines récoltées dans l'Himalaya, le Sikkim, le Népaul, etc.

Acer cæsium.

- pectinatum.
- stachyophyllum.

Aconitum ferox.

Aletris sikkimensis.

Allium Victorialis.

sp. Chitral. Amphicum argutum.

Andromeda formosa. Androsace foliosa.

» sarmentosa.

Anemone rivularis.

» vitifolia.

Anisadenia saxatilis.

Anisodus luridus.

Anotis ingrata.

Antidesma bunius.

Apocynum venetum.

Aralia cachemiriana.

Aster diplostephioides.

Himalaicus.

Astilbe rivularis.

Astragalus stipulaceus.

Aucuba Himalaica.

Berberis aristata.

- » umbellata.
- Wallichiana.

Bœhmeria macrophylla.

» platiphylla.

Brachyactys menthodora.

Brassaiopsis mitis.

Bupleurum falcatum.

Caltha palustris, var. Sikkim.

Campanula colorata.

Carlemannia Griffithii.

Carpesium annuum.

cernuum.

Celastrus stylosus.

Chærophyllum villosum.

var. du Sikkim.

Chelidonium dichranostigma.

Circæa Lutetiana.

Clematis montana.

Cnicus Wallichii.

Codonopsis affinis. Commelina obliqua. Coriaria terminalis. Cotoneaster baccillaris.

» microphylla.

Crawfurdia speciosa.

Cremanthodium oblongatum.

Cucubalus bacciferus.

Cyananthus incanus.

Cydea peltata.

Cynoglossum nervosum.

Dalbergia stipulacea.

Daphniphyllum Himalayense.

Delphinium Cachemirianum.

Deutzia corymbosa.

Dipsacus asper.

Elæocarpus cyaneus.

Escholtzia densa.

» criostachya.

» polystachya.

Enkianthus himalaicus.

Eremurus himalaicus.

Erigeron multiradiatus.

Eriocaulon alpestre.

Eupatorium cannabinum.

Euphorbia officinalis.

» Sikkimensis.

Euphrasia officinalis var.

Evodia rutæcarpa.

Excœcaria baccata.

Flemingia congesta.

Fragaria Daltoniana.

Fritillaria Stracheyi.

Gamblea ciliata.

Gaultheria trichophylla.

Gentiana Sikkimensis.

Tibetica.

Geranium Wallichianum. Gomphostemma parviflora.

Goodyera secundiflora.

Goldenstæda himalaica.

Gymnostemma sedata.

Habenaria latilabis.

Halenia ellyptica.

Heracleum diversifolium. Herpetospermum caudigerum. Hippophaë salicifolia. Hypericum eloides.

» Hookerianum.

reptans.

Impatiens glauca.

» sp. Himalaya.

Inula Hookeri.

» Royleana. Juncus himalaiensis.

Juniperus pseudo-Sabina.

Lactuca hastata.

Lamium amplexicaule.

Leea aspera.

» sambucina.

Leicesteria formosa.

Leontopodium himalaiense.

Leptocodon gracilis.

Lespedeza eriocarpa.

Lilium giganteum.

Lonicera rupicola. » tomentella.

Luffa acutangula.

Luzula campestris (Sikkim).

Mæsa rugosa.

Malvasylvestris (Sikkim).

Meconopsis grandis.

» paniculata.

Wallichiana.

Meliosma dilleniæfolia.

Morine longifolia (Sikkim).

(Kumaon). Myricaria germanica (Sikkim).

Nepeta lamiopsis.

Ophiopogon intermedius.

Osbeckia nepalensis.

» nutans.

» stellata.

Oxyria dygina.

» elatior.

Panicum Crux Galli. Paracaryum cœlestinum.

Pedicularis Clarkei.

flexuosa.

gracilis.

lachnoglossa.

longiflora.

macrantha.

megalantha.

Phœnix rupicola.

Phyllanthus Andersonni.

Pimpinella diversifolia.

Plectranthus Cætsa.

Gerardianus.

scrophularioides.

Podophyllum Emodi.

Polemonium cœruleum.

Polygala arillata.

Polygonatum cyrrhifolium.

Polygonum amplexicaule.

» capitatum.

molle.

pterocarpum.

Polygonum viviparum. Potentilla ambigua.

argyrophylla.

atrosanguinea.

fulgens.

Mooniana.

Primula capitata.

denticulata.

floribunda.

rosea.

Sikkimensis.

Pyrola rotundifolia (Sikkim). Pyrus baccata.

foliosa.

lanata.

Malus.

Sikkimensis.

vestita.

Remusatia vivipara. Rhamnus nepalensis.

Rheum nobile. Rhododendron cameliæflorum.

campanulatum.ciliatum.lepidotum.

Rosa macrophylla.

Roscæa purpurea.

» Sikkimensis.

Rhynchotechum ellipticum.

» vestitum.

Sanicula europæa (Sikkim). Sarcococca pruniformis. Satyrium nepalense.

Saussurea albescens.

» caudicans.

hypoleuca.

uniflora.

Saxifraga ligulata. Scabiosa Hookeri.

Sedum asiaticum.

Selinum tenuifolium.

Senecio acuminatus.

alatus.

Ligularia.

quinquælobus.

retusus.

Sida cordifolia.

Solanum crassipetalum.

verbascifolium.

Spiranthes australis.

Sporolobus indicus.

Stobæa radula.

Swertia bimaculata.

» cordata.

macrosperma.

paniculata.

Taraxacum off. grandiflorum. Thalictrum Chelidoni.

» purpurascens.

Tofieldia nepalensis.

Tsuga Brunoniana.

Tupistra Clarkei.

Viburnum involucratum.

Graines récoltées dans la Sibérie et la Mongolie.

Abies sibirica.
Angelica officinalis.
Astragalus maximus.
Atragene sibirica.
Berteroa incana.
Betula Ermanni.

» nana.
Cirsium Semenowi.
Cladrastis Amurensis.
Claytonia sibirica.
Eleutherococcus senticosus.
Erysimum altaïcum.
Erythronium sibiricum.
Hyosciamus physaloides.

Lactuca altaïca.
Leontopodium sibiricum.
Leuzea salina.
Ligustrina Amurensis.
Papaver croceum.

» nudicaule (sp. du Saïran-nor). » de la région du Baïkal.

Peganum Harmala.
Picea obovata.

» Schrenkiana.
Pinus cembro β sibirica.
Rhamnus dahuricus.
Securinega ramiflora.
Trollius altaicus.

Graines récoltées en Orient et dans les montagnes du Caucase, de l'Asie mineure, de la Grèce et de la Macédoine.

Althæa ficifolia. Alyssum orientale. Amaranthus prostratus.

» quadricolor.» sylvestris.

Anchusa ochroleuca.

» umbellatum.

Arabis albida.

Asphodelina cretica.

Aster alpinus var. roseus.

Atriplex rosea.

Barlia longibracteata.

Betonica grandiflora. Bromus brizæformis.

Buphtalmum speciosum.

Campanula collina.

» macrostyla.

Carduus nuteus.

Carpinus orientalis.

Centaurae adani

Centaurea adonidifolia. Chamæmelon caucasicus.

» oreades.

Chrysanthemum caucasicum.

» cinerariæfolium. Cirsium rhizocephalum.

Crambe cordata.

Datisca Cannabina.

Delphinium caucasicum.

Dianthus caucasicus.

- fragrans.
- » Pancicii.

Dianthus Plumarius type.

» versicolor.

Dioscoræa caucasica. Echinops commutatus.

Eremurus robustus.

- » spectabilis.
- » tauricus.

Erigeron caucasicus.

Erodium pelargonifolium.

Erysimum versicolor.

Euphorbia aleppica.

Farsetia Lunarioides.

Ferula Sumbul.

Garidella nigellastrum.

Gypsophila glauca.

- » elegans.
- » Libanotica.
- Rokejeka.

Hablitzia thamnoides.

Hedera colchica.

Helleborus orientalis.

Hepatica angulosa.

Heracleum Mantegazzianum.

- Pl. gigantesque, monocarpienne, très ornementale, découverte dans le Caucase et introduite par le Jardin alpin d'acclimatation.
- » orientale.
- » persicum.

Hypericum orientale.

» sp. Caucase.

Inula Helenium.

Iris Iberica.

Iris orientalis. Iris orientalis.

Mandragora officinalis.

Matthiola fenestralis. Mulgedium bourgæi. Origanum dictamnus. Ostrva carpinifolia. Pæonia triternata. Paliurus aculeatus. Papaver caucasicum.

- » glaucum.
 » Heldreichii.
- involucratum.

 orientale.

Parrotia persica. Periplocca græca.
Picea orientalis. Pistacia vera. Potentilla abchasica.

- » adjarica.» Kurdica.

Ranunculus asiaticus. Rhamnus Libanoticus. Rhamnus Pallasi.

Salvia argentea.

» Regeliana. Scilla autumnalis. Senecio Biebersteini. Seseli cæspitosum. Silene fimbriata.

» muscipula. Smilax aspera.

» excelsa.

Staphylea colchica. Syringa vulgaris. Telekia cordifolia. Telephium orientale. Teucrium orientale. Thalictrum sp. Caucase. Thymus australis. Trollius caucasicus. Vaccinium Arctostaphylos. Viola macedonica.
Vitex agnus-castus.
Zelkova crenata.

Graines récoltées sur le littoral italien et en Sicile.

Allium siculum.

» vernale.

Antirrhinum siculum. Artemisa arborescens. Asphodelina lutea. Asphodelus fistulosus.

» microcarpus. Biscutella apula. Callibris quadrivalvis. Campanula fragilis.
Capparis rupestris.

» spinosa.

Catananche cœrulea. Ceratonia siliqua (Caroubier). Chamæpeuce Casabonæ. Chrysanthemum miconis.

» carinatum.

Cistus albidus. Colchicum Bertoloni.

» Valery.

Convolvulus althæoides. » siculus.

Coronilla valentina.
Cynoglossum columnæ. Delphinium Staphysagria.
Dianthus Caryophyllus.

- » ciliatus.
- » siculus.

Euphorbia characias.

Euphorbia dendroides.

» peploides. Ferula communis. Fritillaria Messanensis. Genista ætnensis.
cinerea.
ferox,

Hyacinthus dubius.

» romanus. Iberis pinnata.

»...semperflorens.

- » stylosa.» Tenoreana.

Iris alata.

» sicula.

Micromeria græca. Myrthus communis. Nerium Oleander. Pæonia Russi. Pancratium maritimum. Phyllirea latifolia.

» media.

Pistacia lentiscus.

» terebinthus. Punica granatum.

Punica granatum.
Romulea ramifiora.
Scilla autumnalis gallica.

- » Cupani.
- » Hughii.
- obtusifolia.

Senecio ætnensis. Silene fruticosa.

paradoxa.

viridiflora.

Solanum pseudomelongena.

Succonia Balearica. Teucrium Arduini.

flavum.

fruticans.

Graines de Cactées rustiques (résistant aux hivers du centre européen).

Echinocactus Simpsoni. Echinocereus viridiflorus. Mammillaria missouriensis.

» vivipara.

Opuntia arborescens.

- arenaria.
- arkansana.
- Camanchica.
- var. gigantea.
- cymochila.

Opuntia fragilis.

- Greenii.
- mesacantha.
- var. macrorhiza.
- phæacantha.
- major.
- polycantha.
- albospina.
- Raffinesquiana.

Les Cactées ci-dessus lèvent facilement de graines et sont rustiques à nos hivers. Il suffit de les tenir au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil.

Graines de l'Himalaya occidental (Sikkim).

Au dernier moment nous recevons de l'Himalaya occidental (Sikkim), les graines suivantes que nous offrons à 1 fr. le paquet et parmi lesquelles il y a un assez grand nombre de choses nouvelles et rares,

Abies Webbiana.

- Acer Hookeri. » Papilio.
 - pectinatum.
- villosum.

Aconitum ferox, var.

Adenosacme longifolia.

Adenostemma viscosum.

Adonis chrysocyathus.

Ainsliæa aptera.

Aletris nepalensis.

Allium Victoriale var. Sikkim.

Anchusa Sikkimensis.

Anaphalis contorta.

- » nubigena.
- triplinervis.

Arisæma Jacquemontii.

- tortuosum.
- Wallichianum.

Artemisia vulgaris.

Astragalus Sikkimensis.

xyphocarpus.

Berberis angulosa.

- » insignis.
- umbellata.

Betula Bhojpatra.

Boschniakia himalaica.

Bothryospermum tenellum.

Budleya Colvillei.

Bupleurum nigrocarpum.

Calamagrostis littorea.

pilosula v. scabra.

Caltha palustris v. Sikkim. Cardamine macrophylla.

» hirsuta.

Carex atrata.

. setigera. » uncinoides.

Carpesium cernuum. Cathcarthia lyrata.

» villosa.

Cephalotaxus drupaceus. Cerastium vulgatum v. Sikkim. Chrysanthemum Atkinsoni. Chrysosplenium alterni folium. Clematis Buchananiana.

» montana.

Cnicus involucratus. Codonopsis thalictrifolia. Commelina Sikkimensis. Cortia Lindleyii. Corydalis chærsophylla.

filicina.meifolia.

Cyananthus pedunculatus. Cynoglossum micranthum. Delphinium viscosum. Deschampsia cæspitosa. Deyeuxia pulchella.

scabrescens. Dicentra scandens.

Dobinea vulgaris.

Dracocephalum speciosum. Edgaria darjeelingensis.

Etatostema surculosum.

Elshotzia flava.

Epilobium tetragonum.

Erigeron multiradiatus. Eriophyton Wallichianum.

Gamblea ciliata.

Gaultheria nummularioides. Gentiana Elwesii.

» recurvata. Sikkimensis.

Geranium Donianum.

» polyanthes.

Gerbera Kunzeana.

Geum elatum.

» Sikkimense.

Hedysarum Sikkimense. Hemiphragma heterophylla. Heracleum nepalense.

» sublineare.

Holbællia latifolia. Hydrangea vestita.

Hypericum nepalense.

» patulum.

Ilex Hookeri.

» insignis.

Iris Clarkei.

Jasminum humile.

Juneus chrysocarpus.

» Grisebachii.» triglumis.

Juniperus pseudo-sabina.

» recurva.

Juniperus var. Sikkim. Lactuca Dubyæa.

» gracilliflora.

» macrantha.

Lagotis Sikkimensis.

Leontopodium himalayense.

Litsæa sericea.

Lobelia erecta.

Lonicera angustifolia.

Luculia gratissima.

Lychnis nigrescens.

Magnolia Campbelli.

Malva sylvestris.

Mandragora caulescens.

Meconopsis bella.

grandis.

paniculata var. Sikkim.

simplicifolia.

Wallichiana.

Meliosma dilleniæfolia.

Morine betonicoides.

poliphylla.

Nepeta lamiopsis.

Ophioglossum Wallichianum.

Parnassia Wightiana.

Paris poliphylla.

Pedicularis daltoni.

gibbosa.

gracilis.

» v. macrocarpa.

histar.

longiflora,

megallantha v. pauciflora.

regeliana.

sculliana.

syphonantha.

Wallichiana.

Penthapanax Leschenaulti.

Phlomis setigera.

Picrorhiza Kurrooa.

Pimpinella acronemæfolia.

» achillæfolia.

Sikkimensis.

Wallichii.

Plectranthus scrophularioides. Pleurospermum angelicoides.

» Sikkimensis.

Poa flexuosa.

Polygonatum verticillatum v. Sikkim.

Polygonum Campanulatum.

v. fulvida.

filicaulis.

nepalense.

viviparum.

Potentilla coriandrifolium.

diandrum.

fruticosa v. arbuscula.

leuconota.

Mooniana.

peduncularis.

Sibbaldi.

Primula denticulata.

obtusifolia.

petiolaris.

Primula reticulata.

» rotundifolia.

Prunella hispida.

Prunus padus v. glaucescens.

» Puddum.

Pyrus Kurzii.

» microphylla.

Ranunculus affinis.

» diffusus.

Rheum acuminatum.

Rhododendron anthopopon.

Campbelli.

cinnabarinum.

lepidotum.

setosum.

Ribes glaciale. Rubus calycinus.

» niveus.

Rumex nepalensis.

Salix calyculata.

» eriostachya.

Salvia campanulata,

Sambucus adnata.

Sarcopyramis nepalensis. Saussurea eriostemon.

» gossypiflora.

obvallata.

» uniflora.

Saxifraga cordigera.

Saxifraga corymbosa.

» saginoides.

» saginoides. Scrophularia urticifolia. Sedum elongatum.

» himalense.

» trifidum.

Selinum tenuifolium. Senecio acuminatus.

» mortoni.

» retusus.

» Yakla.
Skimmia Laureola.
Smilacina pallida.
Spiræa aruncus

» bella.» sorbifolia.

Stipa orthoraphium. Swertia Kurzii.

» multicaulis.

» paniculata.

Thalictrum chelidonii. Triplostagia glandulifera. Trollius pumilus. Tsuga Brunoniana. Turpinia pomifera.

Veronica himalayensis. Viburnum cordifolium.

Zanthoxylum acanthopodium.

Zingiber Clarkei.

La collection des ouvrages de M. H. Correvon a obtenu le prix d'honneur

offert par la Société d'Horticulture de Neuchâtel à l'Exposition nationale Suisse, en 1896 et plusieurs médailles d'or, de vermeil et d'argent dans les expositions françaises et italiennes.

En vente au Jardin alpin:

ALBUM DES ORCHIDÉES

DE L'EUROPE CENTRALE ET SEPTENTRIONALE

C'est une collection de 60 planches coloriées et 60 pages de texte contenant la description des espèces représentées, des détails sur leur fécondation par les insectes, sur leur histoire, leur géographie botanique et leur culture dans nos jardins par

H. CORREVON

Prix 20 fr. (port en plus).

Atlas de la Flore alpine

Edition française par H. CORREVON

Edité par le Club Alpin allemand et autrichien. 500 planches coloriées, admirablement exécutées, en 5 volumes et un volume de texte.

Prix: 75 francs.

FLEURS ET MONTAGNES

Un volume de poésies par H. CORREVON avec illustrations par M¹¹ Adèle CORREVON Genève 1902 — Prix fr. 2.50.

Ce petit volume de vers dédiés aux amis des fleurs et des montagnes a eu un très grand succès et l'édition paraît devoir en être rapidement épuisée.

I.

III.

IV.

VII.

ouvrages de M. H. CORREVON en VENTE au JARDIN ALPIN

d'acclimatation.

(Les frais de port sont comptés en plus.)

Les plantes des Alpes. Genève 1884. Epuisé.

Les Fougères rustiques. II.

Ouvrage couronné par la Société d'Horticulture de Genève, la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault, le Jury de l'Exposition internationale de Paris 1890, la Société Régionale d'Horticulture de l'Ain, la Société d'Horticulture de Nancy, par des médailles d'or ou d'argent et les félicitations de plusieurs Jurys. — Prix: 5 francs (45 gravures).

Les Orchidées rustiques.

Cet ouvrage a été couronné par plusieurs Jurys. Ouvrage de 250 pages, illustré de 34 gravures, Prix : Fr. 4.-

Flore coloriée de poche, A L'USAGE DU TOURISTE

dans les montagnes de la Suisse, de la Savoie, du Dauphiné et des Pyrénées.

Un volume de 160 pages de texte avec environ 188 figures coloriées, dans le texte même, représentant les plantes de montagnes les plus répandues. Ouvrage d'un format facile à mettre en poche, cartonnage souple avec coins arrondis.

Prix: Fr. 6,50.

Ouvrage très pratique qui a obtenu un grand succès dans le public alpiniste et touriste.

Les plantes alpines et de rocaille, leur culture et leur acclimatation dans nos jardins Un volume relié toile, de 200 pages avec plusieurs illustrations. — Prix : Fr. 2.50

VI. Les Fougères de pleine terre, les Prêles Lycopodes et Sélaginelles rustiques.

Un volume relié toile, 140 pages avec illustrations. — Prix : Fr. 2.50

Le Jardin de l'Herboriste.

Nouvelle édition avec index très complet.

110 gravures. Propriétés et culture des simples et plantes officinales.

Prix: Fr. 3,50.

IMP. W. KÜNDIG & FILS, GENEVE.

INSECTICIDE AMBROSO

Cet insecticide, que nous avons expérimenté au jardin alpin et qui a été vendu sous le nom d'insecticide universel, est d'un effet foudroyant sur les insectes qui s'attaquent aux végétaux. Il est utilisé en grand, en Italie, pour le traitement de la vigne et de plusieurs autres plantes de grande culture. Il n'est composé que de substances non corrosives et ne fait aucun tort aux plantes, même les plus délicates.

Il est inodore et stérilise promptement jusqu'aux œufs des insectes nuisibles.

Prix des boîtes de :

| 750 grammes | . Fr. 1 5 | 75 |
|------------------|---|------|
| 1 k. 500 grammes | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 13.7 |
| 7 k. 500 » | | |

Au Dépôt du Jardin Alpin,

FLORAIRE

près Genève.



